



ARGE Zuckerrübe  
Südwest

# ANBAUINFORMATIONEN 2023

Arbeitsgemeinschaft für Versuchswesen und Beratung im Zuckerrübenanbau in Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz

# GEMEINSAM FÜR DIE RÜBE



QR-Code scannen für Kontaktdaten oder siehe letzten Seite



# INHALT

## ANBAU 2023

---

### SORTEN

- Sortenwahl 4
- SBR 9
- Nematoden 14
- Klassik 16
- Rhizoctonia 18
- Rübenkopfälchen 18
- Bio 19

### PFLANZENSCHUTZ

- Schädlinge 20
- Unkrautbekämpfung 25
- Gräserbekämpfung 32
- Mischreihenfolge 34
- Altverunkrautung 35
- Blattkrankheiten 36
- Düsenwahl & Reinigung 40
- Auflagen 41
- Dokumentation 42
- Abstandsauflagen 43
- Anwendungsbestimmungen 46
- Notizen 50



# KRITERIEN DER SORTENWAHL

Am Anfang der Sortenwahl stellt sich die Frage, gibt es auf meinen Feldern eine Krankheit oder einen Schädling, der durch tolerante oder resistente Sorten kontrolliert werden kann? Beispiel: Sie haben Felder mit Nematodenbesatz, Sie gehen in die Zeile Nematodenbefall: für Felder mit regelmäßig geringem-mittlerem Cercosporabefall wählen Sie unter den aufgeführten Sorten. Die Unterscheidung nach schwachem und starkem Cercosporabefall erfolgt, weil der Erreger in den letzten Jahren zu erheblichen Schäden führte. Im SBR-Segment wurden die Sorten ebenfalls in geringen-mittleren und starken Cercosporabefall untergliedert, da deutliche Unterschiede vorhanden sind. Die Leistungen und Merkmale der gewählten Sorten finden Sie auf den folgenden Seiten.

## SAATGUTBEIZE

Die Beizung für die Aussaat 2023 besteht aus dem Insektizid Force 20 CS (Tefluthrin 60 ml/U) und den Fungiziden Tachigaren 70 WP (Hymexazol 40 g/U) und Rampart (Penthiopyrad 32 ml/U). Diese Ausstattung kostet ca. 40,00 €/U zzgl. MwSt.

### BLATTGESUNDHEIT:

Der Befall mit Blattkrankheiten, besonders mit **Cercospora**, kann die Ertragsleistung der Sorten stark beeinflussen. Sorten mit hoher Toleranz bei Befall mit Blattkrankheiten tragen dazu bei, dass der Schaden in **Starkbefallsgebieten** geringer ausfällt und Fungizidbehandlungen eingespart werden können.

### BEREINIGTER ZUCKERERTRAG (BZE)

ist das Produkt aus Rübenenertrag und bereinigtem Zuckergehalt und steht für den wirtschaftlichen Ertrag.

### BEREINIGTER ZUCKERGEHALT

ist der verwertbare Zucker und ergibt sich aus dem Zuckergehalt abzüglich dem Standardmelasseverlust.

### FELDAUFGANG:

Die Unterschiede zwischen den Sorten sind relativ gering. Der Feldaufgang wird in der Praxis wesentlich stärker durch Umweltbedingungen, Saatbettbereitung und Saattechnik beeinflusst als durch die Sorte.

### SCHOSSER:

sind stärker in den Versuchen in Norddeutschland zu beobachten. In unseren Versuchen traten nur vereinzelt Schosser auf. Aufgrund unterschiedlicher Standorte kann die Einstufung in unterschiedlichen Versuchsserien variieren.

# Wählen Sie die richtige Sorte für Ihren Standort nach zu erwartenden Krankheiten und Schädlingen aus!

Sorteneignung für Standorte	für Flächen mit		Sorte	Züchter / Vertrieb	Saatgutpreis €/U <sup>1</sup>	Seite
mit SBR (Syndrome de basses richesses = Syndrom niedriger Zuckergehalt) und Nematodenbefall	starkem Cercosporabefall		Fitis	SV	280,15	10 – 13
			Kakadu	SV	279,13	
			Citrus*	SV	260,49	
			Chevrolet*	Strube	259,00	
			Laser*	HH	299,30	
	geringem-mittlerem Cercosporabefall		Josephina KWS	KWS	289,00	
			Lunella KWS	KWS	284,50	
			BTS 7300 N	BTS	284,90	
mit Nematodenbefall, -verdacht	starkem Cercosporabefall		BTS 6975 N	BTS	298,90	14 – 15
			Blandina KWS	KWS	352,50	
	geringem-mittlerem Cercosporabefall		Lunella KWS	KWS	284,50	
			BTS 7300 N	BTS	284,90	
			Josephina KWS	KWS	289,00	
			Kakadu	SV	279,13	
			Annarosa KWS	KWS	282,50	
			Orpheus	Strube	264,00	
ohne speziellen Krankheitsbefall -Klassik-Sorten	starkem Cercosporabefall		Jellera KWS	KWS	252,50	16 – 17
			BTS 2045	BTS	250,80	
			Ludovica KWS	KWS	325,50	
			Vanilla	HH	224,40	
	geringem-mittlerem Cercosporabefall		Calledia KWS	KWS	251,50	
			Clemens	Strube	251,00	
			Marley	Strube	255,00	
			Lomosa	SV	219,66	
			Kleiber	SV	226,51	
mit Rhizoctoniabefall -verdacht	mit Nematoden		BTS 3645 RHC	BTS	302,50	18
	ohne Nematoden		BTS 6000 RHC	BTS	269,50	
mit Ditylenchus	mit Nematoden	starkem Cercosporabefall	Kakadu	SES	279,13	18
		geringem-mittlerem Cercosporabefall	Josephina KWS	KWS	289,00	
	ohne Nematoden		Lomosa	SV	219,66	

\*EU-Sorte; <sup>1</sup> netto incl. Beizaustattung zur Restbestellung 2023

# BIO-RÜBEN

siehe Seite 19

Sorteneignung für Standorte	für Flächen mit		Sorte	Züchter / Vertrieb	Saatgutpreis €/U <sup>1</sup>		
mit Bio-Rüben	Nematodenbefall	starkem Cercosporabefall	Blandina KWS	KWS	352,50		
			BTS 6975 N	BTS	298,90		
		geringem - mittlerem Cercosporabefall	Annarosa KWS	KWS	282,50		
			Orpheus	Strube	287,00		
			Fitis	SES	280,00		
		Klassik-Sorte			BTS 2045	BTS	264,80
			Calledia KWS	KWS	251,50		
			Jellera KWS	KWS	252,50		
			Lomosa	SV	244,19		
			Rigoletto	Strube	263,00		
	mit SBR (Syndrom niedriger Zuckergehalt) & Nematodenbefall				Fitis	SES	280,00

<sup>1</sup> netto incl. Beizaustattung zur Restbestellung 2023

# SONAR

## SORTENWAHL

NACHHALTIG UND RESILIENT

Insbesondere bei Schädlingen und Krankheiten, für deren Bekämpfung keine Pflanzenschutzmittel zur Verfügung stehen wie bei der Schilf-Glasflügelzikade, stellt die Sortenwahl einen maßgebenden Pfeiler im Krankheits- und Schädlingsmanagement dar. Bisher ist sogar davon auszugehen, dass in naher Zukunft nur mit dem Einsatz toleranter Sorten gegen einige Schädlinge und Krankheiten die Stabilisierung des Zuckerrübenanbaus gelingen kann. Durch eine optimal an den Standort angepasste Sortenwahl kann der Ertrag nachhaltig gesteigert werden und der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln reduziert werden. In der heutigen Praxis ist es üblich, den Fokus auf die Ertragsleistung der Sorten zu legen. Alle anderen Faktoren werden schwächer gewichtet. Dies hat zur Folge, dass Sorten, die ertragsmäßig ähnlich abschneiden, nachrangig oder gar nicht gelistet werden, obwohl sie durch Resistenzen oder höhere Toleranzen zu einem besseren betriebswirtschaftlichen und auch einem ökologisch verträglicheren Ergebnis führen würden. Um die Landwirte bei dieser Fragestellung zu unterstützen, wurde Anfang 2022 das Projekt SONAR ins Leben gerufen.



SONAR

### DER SORTENBERATER FÜR IHREN STANDORT

Durch die geschickte Kombination von Klimadaten, Befallsdaten, ackerbaulichen- und betrieblichen Parametern sowie Sortenergebnissen sollen Sie zukünftig die Möglichkeit haben, eine auf ihren Standort angepasste Sortenberatung zu erhalten.

# PROBLEME REGIONAL UNTERSCHIEDLICH


Um die Ausbreitung von Schädlingen und Krankheiten in den einzelnen Regionen zu erfassen, wird in SONAR ein Monitoring von Blattläusen, Schilf-Glasflügelzikaden, Nematoden sowie Blattkrankheiten, dem SBR- und Virusbefall durchgeführt. Innerhalb des Monitorings konnten starke regionale Unterschiede des Befalls festgestellt werden.

Im Vergleich zum vorigen Jahr konnte in 2022 eine Ausbreitung der Schilf-Glasflügelzikade nach Norden beobachtet werden. Am stärksten zeigte sich der Befall im Raum Worms, jedoch konnte auch an den übrigen Standorten eine deutliche Zunahme der Schilf-Glasflügelzikade festgestellt werden. Selbst an den nördlichsten Standorten wurden Schilf-Glasflügelzikaden gefunden. Um dem Befall entgegenzuwirken, empfiehlt es sich, in den betroffenen Regionen ausschließlich SBR-tolerante Sorte anzubauen.

Die Sortenempfehlungen finden Sie auf den folgenden Seiten.

Das Projekt „SONAR“ wird im Rahmen des Entwicklungsprogramms EULLE unter Beteiligung der Europäischen Union und des Landes Rheinland-Pfalz, vertreten durch das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau, gefördert.

AUFTRETEN SCHILF-GLASFLÜGELZIKADE



Anzahl an Leimtafeln  
von 20.05. – 02.09.22






# SBR-BEFALL

SYNDROM NIEDRIGER ZUCKERGEHALT

SBR (Syndrome de basses richesses – Syndrom niedriger Zuckergehalt): Diese Rübenkrankheit wurde erstmals in Frankreich beobachtet. Es handelt sich dabei um eine bakterielle Erkrankung, die durch Zikaden übertragen wird. Befallsbeginn ab Mai. Die Symptome – vergilbte Blätter, schmale asymmetrische Herzblätter, verbräunte Gefäßbündel - treten ab Juli/August auf. Befallene Bestände können bis zu 3 % geringeren Zuckergehalt absolut aufweisen und bis zu 45 % weniger Zuckerertrag. Eine Bekämpfung der Zikaden ist derzeit nicht möglich. SBR ist zuerst in geringem Umfang im Großraum Heilbronn aufgetreten. In den Anbaujahren ab 2017 trat der Befall aber auf wesentlich größerer Fläche und in viel stärkerer Ausprägung auf.

Die empfohlenen Sorten haben sich in unseren Versuchen auf Befallsflächen als widerstandsfähiger erwiesen.



## SYMPTOME


vergilbte Blätter, schmale asymmetrische Herzblätter, verbräunte Gefäßbündel - treten ab Juli/August auf.

# Leistung der empfohlenen Sorten im Vergleich



## SBR-Sortentestung 2022, n= 5


(NIKIZ / ARGE Zuckerrübe Südwest; Verrechnungssorten: Chevrolet, Fitis & Lunella KWS; BZE = relativ 100)



Das Projekt „NIKIZ“ wird im Rahmen des Entwicklungsprogramms EULLE unter Beteiligung der Europäischen Union und des Landes Rheinland-Pfalz, vertreten durch das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau, gefördert.


## SBR-Sortentestung 2021 – 2022 (n=14),

(NIKIZ / ARGE Zuckerrübe Südwest; Verrechnungssorten: Chevrolet, Fitis und Lunella KWS; BZE = relativ 100)



Das Projekt „NIKIZ“ wird im Rahmen des Entwicklungsprogramms EULLE unter Beteiligung der Europäischen Union und des Landes Rheinland-Pfalz, vertreten durch das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau, gefördert.

## Sonderprüfung SBR-Toleranz bundesweit



Auswertung der Sonderprüfung SBR vom Bundessortenamt (2021-2022); Verrechnungssorten sind Danicia KWS, Lunella KWS, BTS 2045 und Rhinema, diese entsprechen einem BZE von relativ 100; n=15.

## EU-SORTEN:

In den internen SBR-Versuchen der ARGE Südwest wurden ebenfalls die EU-Sorten Citrus (SV) und Laser (HH) getestet. Beide Sorten sind nematodentolerant. Die Ergebnisse finden sie in der einjährigen Grafik auf Seite 10.

# Standorte mit SBR-Befall

empfohlene Sorten im Fettdruck

Sortenvergleich SBR-Befall Auswertung SP SBR bundesweit 2021-2022 (n=15) Danicia KWS, Lunella KWS, Rhinema, BTS 2045 = 100							-Auszug-		Blattbonitur Versuche mit Fungizidbehandlung		Saatgutpreis €/U  netto
Sorte	Sorte ist: nematodentolerant N/ NICHT nematodent. K/ blattgesund C/ für Rhizoctonia- Verdachtsflächen RH	Ver- trieb <sup>2</sup>	bereinigter Zuckerertrag  rel.	Rüben- ertrag  rel.	bereinigter Zuckergehalt  rel.	Schosser <sup>3</sup>  Pfl./ha	Cercospora <sup>1</sup>	Gelbver- färbung	Force 20 CS, Tachigaren, Rampart		
<b>Empfohlene Sorten bei starkem Cercosporabefall</b>											
Fitis	<b>N</b>	<b>SV</b>	<b>116,5</b>	<b>109,0</b>	<b>106,4</b>	<b>0</b>	<b>3,3</b>	<b>2,5</b>	<b>280,15</b>		
Kakadu	<b>N</b>	<b>SV</b>	<b>110,6</b>	<b>108,3</b>	<b>102,0</b>	<b>0</b>	<b>3,0</b>	<b>2,9</b>	<b>279,13</b>		
<b>Empfohlene Sorten bei geringem-mittlerem Cercosporabefall</b>											
Lunella KWS	<b>N</b>	<b>KWS</b>	<b>108,4</b>	<b>107,3</b>	<b>101,1</b>	<b>42</b>	<b>4,2</b>	<b>2,8</b>	<b>284,50</b>		
BTS 7300 N	<b>N</b>	<b>BTS</b>	<b>106,2</b>	<b>105,0</b>	<b>100,9</b>	<b>0</b>	<b>3,6</b>	<b>3,7</b>	<b>284,90</b>		
<b>Einjährige Ergebnisse (2022; n=6)</b>											
Josephina KWS	<b>N</b>	<b>KWS</b>	<b>113,0</b>	<b>109,7</b>	<b>102,5</b>	<b>0</b>	<b>3,4</b>	<b>2,8</b>	<b>289,00</b>		
Chevrolet*	<b>N</b>	<b>ST</b>	<b>104,0</b>	<b>102,4</b>	<b>100,3</b>	<b>0</b>	<b>2,9</b>	<b>2,4</b>	<b>259,00</b>		

\*EU-Sorte

<sup>1</sup> Die Blattkrankheiten wurden nach Schwellenwert bekämpft. Boniturnoten: 1 – 9; 1 = kein Befall, 9 = alle Blätter abgestorben

<sup>2</sup> BTS = Betaseed; HH = Hilleshög, KWS = KWS Saat SE; ST = Strube D&S GmbH; SV = SESVANDERHAVE

<sup>3</sup> Schosseranzahl in Pflanzen/ha, in der Regel treten diese stärker in Nord- und Ostdeutschland auf

Preisänderungen sind möglich



# NEMATODEN

## SCHADBILD

---

Ab Mitte Mai tritt in befallenen Rüben ein Wachstumsrückstand auf. Bei Sonneneinstrahlung welken befallene Rüben nesterweise schneller als der Restbestand. Beim Ausgraben der Rübenwurzel ist eine verstärkte Seitenwurzelbildung bis hin zum Wurzelbart erkennbar. Nach kurzer Verweildauer an der Luft werden abhängig vom Entwicklungsstadium der Nematoden stecknadelkopfgroße, zitronenförmige weiße Zysten an den Wurzeln erkennbar. Die Entwicklung der Nematoden ist stark witterungs- und bodenabhängig. In günstigen Jahren (feucht, warm) können sich 3-5 Generationen entwickeln. Früher Nematodenbefall wirkt sich besonders stark ertrags- und qualitätsmindernd aus. Ertragsverluste von über 20 % sind möglich.

# Standorte mit Nematodenbefall oder -verdacht ohne SBR-Befall

Ergebnisse der Sortenleistung auf Feldern ohne Nematodenbefall siehe Seite 16-17 Sortierung nach BZE, empfohlene Sorten im Fettdruck

Sortenversuche mit Nematodenbefall (SV-N) 2020-2022 mit Fungizidbehandlung -bundesweit- Lisanna KWS, BTS 440, BTS 7300 N = 100								Blattgesundheit <sup>5</sup> Versuche mit Fungizidbehandlung		Saatgutpreis €/U netto
Sorte	Sorte ist: blattgesund C/ für SBR Standorte S/ für Rhizoctonia- Verdachtsflächen RH/ Conviso Co	Ver- trieb <sup>6</sup>	bereinigter Zuckerertrag  rel.	Rüben- ertrag  rel.	bereinigter Zuckergehalt  rel.	Feld- aufgang  rel.	Schosser <sup>7</sup>  Pfl./ha	Cercos- pora	Mehltau	Force 20 CS, Tachigaren, Rampart
<b>Empfohlene Sorten bei starkem Cercosporabefall:</b>										
<b>BTS 6975 N<sup>1</sup></b>	<b>C</b>	<b>BTS</b>	101,8	103,0	98,9	98,6	14	2,0	1,7	<b>284,90</b>
<b>Blandina KWS<sup>1</sup></b>	<b>C</b>	<b>KWS</b>	98,2	104,1	94,4	100,3	24	1,7	2,4	<b>352,50</b>
<b>Empfohlene Sorten bei geringem-mittlerem Cercosporabefall</b>										
<b>Lunella KWS</b>		<b>KWS</b>	102,8	104,0	99,0	99,5	21	3,3	1,7	<b>284,50</b>
<b>BTS 7300 N</b>		<b>BTS</b>	101,6	101,9	99,7	98,5	7	3,3	2,1	<b>284,90</b>
<b>Josephina KWS<sup>2</sup></b>		<b>KWS</b>	100,7	101,8	99,0		5	2,9	3,2	<b>289,00</b>
<b>Annarosa KWS</b>		<b>KWS</b>	100,6	99,9	100,6	98,8	7	2,9	1,8	<b>282,50</b>
<b>Kakadu<sup>1</sup></b>		<b>SV</b>	100,6	103,6	97,1	102,3	7	2,6	1,6	<b>279,13</b>
<b>Orpheus</b>		<b>ST</b>	98,1	95,1	103,1	102,2	3	2,8	2,3	<b>264,00</b>
<b>Weitere Sorten:</b>										
Thaddea KWS		KWS	102,7	108,1	95,4	98,0	4	3,5	1,6	265,50
BTS 5715 N <sup>2</sup>		BTS	102,0	105,8	96,4		5	3,0	2,2	
Feliciana KWS		KWS	101,4	107,6	94,4	95,4	0	3,1	1,5	284,50
Caprianna KWS		KWS	101,3	102,3	99,1	100,7	7	3,5	2,5	292,50
Lisanna KWS		KWS	100,9	100,7	100,1	101,4	15	2,8	1,8	259,00
Fitis <sup>1</sup>	S	SV	100,0	100,5	99,6	102,4	14	2,7	2,1	280,15
Baronika KWS <sup>2</sup>		KWS	99,5	97,3	102,2		14	2,7	1,8	
BTS 440		BTS	97,5	97,3	100,2	100,1	0	2,5	1,6	257,40
BTS 3645 RHC <sup>2</sup>	RH	BTS	96,7	96,9	99,9		4	2,5	2,3	302,50
BTS Smart 9245 N <sup>4</sup>	Co	BTS	93,2	94,1	99,0	98,1	101	3,0	1,6	
Smart Thekla KWS <sup>3</sup>	Co	KWS	88,4	87,7	100,6	95,5	20	3,2	2,4	

<sup>1</sup> Daten 2020 aus der WP NT, Feldaufgang nur zweijährige Daten <sup>2</sup> Daten 2020 und 2021 aus der WP NT, Feldaufgang nur einjährige Daten (daher keine Werte) <sup>3</sup> Daten aus WP NT 2018, SV-N 2021 und SV-N 2022; Feldaufgang zweijährige Daten <sup>4</sup> Daten aus WP NT 2019, SV-N 2021 und SV-N 2022; Feldaufgang zweijährige Daten

<sup>5</sup> Die Blattkrankheiten wurden nach Schwellenwert bekämpft. Boniturnoten: 1 – 9; 1 = kein Befall, 9 = alle Blätter abgestorben <sup>6</sup> BTS = Betaseed; KWS = KWS Saat SE;

ST = Strube D&S GmbH; SV = SESVANDERHAVE <sup>7</sup> Schosseranzahl in Pflanzen/ha, in der Regel treten diese stärker in Nord- und Ostdeutschland auf

Preisänderungen sind möglich

# Standorte ohne Nematodenbefall – KLASSIKSORTEN

Ertrag und Qualität in Sortenversuchen relativ\* Mittel bundesweite Standorte 2020 – 2022 mit fungizider Behandlung

empfohlene Sorten im Fettdruck

Sorte	Sorte ist: für SBR Standorte S / nematodentolerant N / blattgesund C / für Rhizoctonia-Ver- dachtsflächen RH / Vergilbungstolerant V/ Conviso Co		Ver- trieb <sup>4</sup>	bereinigter	Rüben-	bereinigter.	Feldauf-	Schos-	Blattgesundheit			Saatgutpreis €/U incl. Beizausstattung netto
				Zucker-	ertrag	Zucker-	gang	ser	Bonitur <sup>6</sup>		Toleranz <sup>7</sup>	Force 20 CS, Tachigaren, Rampart
				ertrag	rel.	ertrag	rel.	ertrag	rel.	Pfl./ha.		
<b>Empfohlene Sorten:</b>												
<b>Calledia KWS</b>	<b>C</b>	<b>KWS</b>		<b>104,1</b>	<b>103,8</b>	<b>100,4</b>	<b>101,0</b>	<b>21</b>	<b>4,0</b>	<b>2,2</b>	<b>-9,1</b>	<b>251,50</b>
<b>Clemens</b>		<b>ST</b>		<b>102,8</b>	<b>106,2</b>	<b>96,9</b>	<b>98,8</b>	<b>35</b>	<b>4,9</b>	<b>3,4</b>	<b>-11,3</b>	<b>251,00</b>
<b>Jellera KWS<sup>1</sup></b>	<b>C</b>	<b>KWS</b>		<b>101,4</b>	<b>103,3</b>	<b>98,1</b>	<b>100,0</b>	<b>82</b>	<b>3,3</b>	<b>2,4</b>	<b>-7,5</b>	<b>252,50</b>
<b>BTS 2045</b>	<b>C</b>	<b>BTS</b>		<b>101,3</b>	<b>101,4</b>	<b>100,0</b>	<b>102,3</b>	<b>34</b>	<b>3,7</b>	<b>1,8</b>	<b>-5,8</b>	<b>250,80</b>
<b>Marley</b>		<b>ST</b>		<b>98,9</b>	<b>95,4</b>	<b>103,6</b>	<b>101,0</b>	<b>37</b>	<b>4,6</b>	<b>3,0</b>	<b>-9,4</b>	<b>255,00</b>
<b>Lomosa</b>		<b>SV</b>		<b>98,6</b>	<b>101,8</b>	<b>96,9</b>	<b>100,3</b>	<b>5</b>	<b>4,2</b>	<b>2,5</b>	<b>-7,7</b>	<b>219,66</b>
<b>Vanilla<sup>3</sup></b>		<b>HH</b>		<b>95,9</b>	<b>98,5</b>	<b>97,6</b>	<b>95,1</b>	<b>22</b>	<b>3,6</b>	<b>1,8</b>	<b>-8,4</b>	<b>224,40</b>
<b>Weitere Sorten (teils auch Sorten mit Nematodentoleranz auf Flächen OHNE Nematodenbefall):</b>												
Lunella KWS	N	KWS		104,1	106,2	98,1	99,1	38	4,9	2,0	-9,5	284,50
Thaddea KWS	N	KWS		103,9	110,8	93,8	98,5	17	5,2	2,0	-10,8	265,50
BTS 7300 N	N	BTS		103,4	104,3	99,2	99,4	49	4,9	2,4	-9,1	284,90
Feliciana KWS	N	KWS		103,1	111,1	92,8	95,4	5	4,8	1,9	-10,2	284,50
Caprianna KWS <sup>1</sup>	N	KWS		102,7	104,9	97,7	100,1	22	5,4	2,9	-11,3	292,50
Florentina KWS <sup>1</sup>		KWS		102,5	104,6	98,0	102,5	19	5,6	2,2	-10,8	252,50
BTS 6975 N <sup>2</sup>	C	BTS		102,2	105,0	97,2	98,5	25	3,5	2,4	-8,0	284,90
Advena KWS		KWS		101,4	104,6	97,1	100,0	17	4,9	2,9	-11,7	248,00
Lisanna KWS	N	KWS		101,3	101,5	99,8	101,0	5	4,4	2,1	-9,3	259,00
Inspirea KWS <sup>2</sup>	C	KWS		100,9	100,8	100,1	99,2	58	2,8	3,5	-8,2	322,50
BTS 3750		BTS		100,8	103,1	97,7	99,8	11	4,5	2,2	-8,4	232,00
Capone <sup>1</sup>		ST		100,7	104,6	96,2	102,7	28	5,3	4,6	-11,9	261,00
BTS 6000 RHC	RH	BTS		100,4	104,5	96,1	99,8	70	4,6	2,1	-9,9	269,50
BTS 6740 <sup>1</sup>		BTS		100,1	103,1	97,0	102,5	58	5,1	2,0	-8,8	254,10
Annarosa KWS	N	KWS		100,0	99,9	100,0	99,3	12	4,4	2,0	-7,0	282,50



Sorte	Sorte ist: für SBR Standorte S / nematodentolerant N / blattgesund C / für Rhizoctonia-Ver- dachtsflächen RH / Vergilbungstolerant V/ Conviso Co	Ver- trieb <sup>4</sup>	bereinigter Zucker- ertrag	Rüben- ertrag	bereinigter. Zucker- gehalt	Feldauf- gang	Schos- ser	Blattgesundheit			Saatgutpreis €/U incl. Beizausstattung netto
			rel.	rel.	rel.	rel.	Pfl./ha.	Bonitur <sup>6</sup>		Tole- ranz <sup>7</sup>	Force 20 CS, Tachigaren, Rampart
								Cercospora	Mehltau		
Dancia KWS		KWS	99,8	103,2	96,6	98,6	12	4,6	2,0	-10,8	220,00
Rigoletto <sup>2</sup>		ST	99,7	98,6	101,0	101,2	19	4,6	3,4	-8,4	265,00
Orpheus <sup>1</sup>	N	ST	99,7	97,0	102,7	102,8	41	4,5	3,0	-11,4	264,00
Fitis <sup>2</sup>	S	SV	99,6	100,3	99,2	101,8	30	4,9	3,3	-9,1	280,15
Sittich <sup>1</sup>		SV	99,5	99,5	99,9	105,7	12	4,8	3,4	-10,0	216,70
Gimpel <sup>1</sup>	C	SV	99,4	102,7	96,7	100,3	11	4,4	2,6	-9,4	244,07
Kakadu <sup>2</sup>		SV	99,3	103,1	96,3	102,4	5	4,5	2,9	-8,6	279,13
BTS 440	N	BTS	99,1	99,3	99,8	99,9	5	3,8	1,9	-8,2	257,40
Blandina KWS <sup>2</sup>		KWS	99,1	106,6	92,9	101,1	45	2,5	3,5	-6,7	352,50
Hannibal		ST	98,7	95,3	103,6	102,7	22	4,6	3,2	-8,7	218,00
Picus		SV	98,4	95,8	102,6	102,6	5	4,5	3,0	-9,2	218,88
Wilson		ST	98,3	94,9	103,5	102,1	16	4,4	2,9	-8,7	258,00
Pitt <sup>1</sup>		ST	97,9	98,5	99,4	102,5	24	4,6	2,7	-9,0	259,00
Clarion <sup>2</sup>		ST	97,3	98,3	98,8	99,9	27	5,0	5,0	-11,1	
<b>Daten aus dem Leistungsvergleich neuer Sorten (LNS):</b>											
<b>Ludovica KWS</b>	<b>C</b>	<b>KWS</b>	<b>101,6</b>	<b>103,9</b>	<b>97,8</b>	<b>95,8</b>	<b>6</b>	<b>2,2</b>	<b>2,7</b>	<b>-4,2</b>	<b>325,50</b>
<b>Kleiber</b>		<b>SV</b>	<b>100,5</b>	<b>102,8</b>	<b>97,6</b>	<b>103,9</b>	<b>15</b>	<b>4,3</b>	<b>4,1</b>	<b>-6,8</b>	<b>226,51</b>
BTS 5715 N	N	BTS	102,6	107,6	95,3	100,1	13	4,6	2,6	-6,9	
Josephina KWS	N	KWS	101,6	103,6	98,0	99,1	9	5,0	4,8	-8,6	<b>289,00</b>
BTS 5650		BTS	100,4	101,1	99,3	95,5	30	4,9	3,5	-6,8	
Baronika KWS	N	KWS	99,9	98,0	101,9	95,9	17	4,5	3,0	-8,0	
Branta		SV	98,7	104,1	94,8	103,3	37	4,2	3,1	-6,7	
Dohle		SV	98,7	106,7	92,4	99,2	34	3,8	2,5	-6,7	
BTS 3645 RHC	RH, N	BTS	97,1	98,6	98,6	97,2	28	4,7	4,1	-8,3	302,50
Novatessa KWS	RH, C	KWS	94,6	96,4	98,2	100,1	38	2,4	3,3	-5,9	345,00

\* 100 = Verrechnungsmittel der Sorten Lisanna KWS, Dancia KWS, Marley, Annarosa KWS

Preisänderungen sind möglich

<sup>1</sup> Daten 2020 aus LNS;

<sup>2</sup> Daten 2020 aus WP S2 und 2021 aus LNS;

<sup>3</sup> Daten aus LNS 2019, SV 2021 und SV 2022;

<sup>4</sup> BTS = Betaseed; HH = Hilleshög; KWS

= KWS Saat SE; ST = Strube D&S GmbH; SV = SESVANDERHAVE<sup>5</sup> Schosseranzahl in Pflanzen/ha, in der Regel treten diese stärker in Nord- und Ostdeutschland auf

<sup>6</sup> Blattgesundheit: Bewertung in der Stufe ohne Fungizidbehandlung; Boniturnoten: 1 – 9; 1 = kein Befall; 9 = alle Blätter abgestorben

<sup>7</sup> Toleranz: zeigt den relativen Verlust an bereinigtem Zuckerertrag bei unterlassenen Fungizidbehandlungen

# RHIZOCTONIA

## BEFALLSSTANDORTE

**SCHADBILD:** Trockenfäule an der Rübenoberfläche, die auf die ganze Pflanze übergreift. Ab Reihenschließen: welkende Blätter, gehemmtes Wachstum, nesterweises Absterben der Rüben. Tritt häufig in Maisfruchtfolgen nach Strukturschäden, verursacht bei der Maisernte, auf.

## SORTEN EMPFEHLUNG

Für bekannte Befallsflächen wird der Anbau einer rhizoctoniatoleranten Sorte empfohlen. Möglichst kein Anbau von Zuckerrüben nach Mais, bzw. vorbeugen durch Zerkleinerung und Einarbeitung von Ernterückständen und wendende Bodenbearbeitung. Sollten gleichzeitig Nematoden auf der Fläche vorhanden sein, sollte die Sorte BTS 3645 RHC angebaut werden, da die Sorte im Vergleich zur BTS 6000 RHC auch nematodentolerant ist.

### FÜR BEFALLSFLÄCHEN

**BTS 3645 RHC** (302,50 €/U<sup>1</sup>)

### FÜR VERDACHTSSFLÄCHEN

**BTS 6000 RHC** (269,50 €/U<sup>1</sup>)



## BEFALLSSTANDORTE

# DITYLENCHUS DIPSACI

## Rübenkopfälchen

**SCHADBILD:** im Sommer gekräuselte und verdrehte Blätter, nesterweise Kopffäule. Der Schädling tritt ortstreu auf, eine Ausbreitung des Befalls ist eher selten.

**SORTENEMPFEHLUNG:** auf bekannten Befallsflächen weniger anfällige Rübensorten anbauen. Kein Anbau von **Gelbsenf**, da er eine Wirtspflanze des Rübenkopfälchens ist.

### MIT NEMATODENBEFALL – CERCOSPORADRUCK

**starkem**

**Kakadu** (279,13 €/U<sup>1</sup>)

**geringem-mittlerem**

**Josephina KWS** (289,00 €/U<sup>1</sup>)

### OHNE NEMATODENBEFALL

**Lomosa** (219,66 €/U<sup>1</sup>)

<sup>1</sup> Saattgutbeize: Force 20 CS, Tachigaren, Rampart

# BIO-RÜBEN

Auch im Öko-Anbau ist die Frage nach dem Nematodenbesatz der Fläche ein wichtiges Auswahlkriterium bei der Sortenwahl. Daneben sollte die Sorte möglichst blattgesund (s.S. 16/17) sein. Eine zügige Jugendentwicklung und ein starker, gesunder Blattapparat wirken sich positiv auf die Unkrautunterdrückung aus.



## SORTEN- EMPFEHLUNG

### SBR & NEMATODENBEFALL

Fitis (280,00 €/U)

### MIT NEMATODENBEFALL BEI GERINGEN-MITTLEREN CERCOSPORADRUCK

Annarosa KWS (282,50 €/U)

Orpheus (287,00 €/U)

Fitis (280,00 €/U)

### MIT NEMATODENBEFALL BEI STARKEM CERCOSPORADRUCK

Blandina KWS (352,50 €/U)

BTS 6975 N (298,90 €/U)

### OHNE NEMATODENBEFALL

BTS 2045 (264,80 €/U)

Calledia KWS (251,50 €/U)

Jellera KWS (252,50 €/U)

Lomosa (244,19 €/U)

Rigoletto (263,00 €/U)



# SCHÄDLINGE

---

## INSEKTIZIDE IN DER PILLIERUNG:

Das Saatgut zur Aussaat 2023 ist in der Insektizidausstattung **Force 20 CS (Tefluthrin 10 g/U)** gebeizt.

**Force 20 CS (Tefluthrin)** ist wirksam gegen Bodenschädlinge, es bildet einen Beizhof um die Pille. Die Wirkungsdauer ist durch den niedrigen Wirkstoffgehalt begrenzt. Oberirdisch fressende Schädlinge werden nicht erfasst. Diese müssen bei entsprechendem Auftreten mit Insektiziden behandelt werden. Besonders wichtig ist die gezielte Bekämpfung von Virusvektoren (Grüne Pfirsichblattlaus) um die Übertragung von Vergilbungsviren zu verhindern. Zur Ermittlung der optimalen Behandlungstermine wird das Blattlausmonitoring fortgeführt.



## SCHWARZE BOHNENLAUS

Der Befall tritt ab Mai auf. Sie ist weniger gefährlich als die Grüne Pfirsichblattlaus, da sie nur in wenigen Fällen virusbeladen ist und meist nur im Randbereich der Felder verstärkt auftritt. Bei beginnender Besiedelung sind häufig Randbehandlungen ausreichend. Der Befall war 2022 in den meisten Gebieten als hoch einzustufen.


**Bekämpfungsschwellen:** Nach Erstfunden in Gelbschalen bis BBCH 39 (Reihenschließen) direkte Beobachtung im Bestand. 30% befallene Pflanzen; ab BBCH 39: 50% befallene Pflanzen.



## GRÜNE PFIRSICHBLATTLAUS

Der Befall tritt ab Mai auf. Der Hauptschaden wird durch die Übertragung des Rübenvergilbungsvirus verursacht. Der Virusbefall zeigt sich im Sommer in Form von gelben Blattspitzen, die beim Zerdrücken in der Hand ein typisches, knackendes Geräusch verursachen. Der Befall durch die Grüne Pfirsichblattlaus war 2022 höher als in der vorherigen Saison. Dies ist auf die warmen Temperaturen zurückzuführen. Die Beizung bietet keinen ausreichenden Schutz. Deshalb muss ein Monitoring stattfinden, um den optimalen Termin für die notwendigen Insektizidspritzungen zu ermitteln. Beachten Sie aktuelle Hinweise und Artikel in der DZZ.

**Bekämpfungsschwelle:** Nach Erstfunden in Gelbschalen bis BBCH 39 (Reihenschließen) direkte Beobachtung im Bestand. 10% befallene Pflanzen



## MOOSKNOPF- KÄFER

Der Moosknopfkäfer schädigt unterirdisch durch Fraß an der Wurzel und dem Hypokotyl. Die Pflanzen werden in der Entwicklung gebremst oder sterben bei starkem Befall ab. Der Schädling tritt auch oberirdisch auf. Das Schadbild zeigt sich als kleine runde Löcher in den Wurzeln und Keimblättern. Oberirdisch auftretender Moosknopfkäfer muss mit Insektiziden bekämpft werden.


**Bekämpfungsschwelle:** 20% geschädigte Pflanzen bis BBCH 14




## DRAHTWURM

Der Drahtwurm ist ein Bodenschädling und kann Rüben bis zum 6-Blattstadium schädigen. Er beißt die Wurzel durch, die Rübe stirbt. Eine Bekämpfung wird durch die Insektizidbeizung der Pillen erreicht, die bei starkem Befall häufig jedoch nicht ausreicht. Eine nachträgliche Bekämpfung mit Insektiziden ist nicht möglich.

## TAUSENDFÜSSLER



Der Tausendfüßler ist ein Bodenschädling und verursacht Fraßschäden an den Wurzeln. Bei starkem Befall sterben die Rüben ab. Wie bei Drahtwurm ist eine nachträgliche Bekämpfung nicht möglich.




## SPITZSTEISSIGER RÜBENRÜSSLER

Der Schädling trat auch 2022 in einigen Feldern auf. Punktuell wurden Teilflächen umgebrochen. Behandlungen mit Pyrethroiden konnten die Ausbreitung reduzieren.

## RÜBENERDFLOH



Der Rübenerdfloh kann ab dem Auflauf auftreten. Er verursacht Fenster- und Lochfraß. Auch 2022 wurde regional sehr starker Befall, bis zum Umbruch beobachtet. Eine zweite Welle konnte durch die Trockenheit dieses Jahr teils beobachtet werden. Eine Bekämpfung wird bei 20 % vernichteter Blattfläche oder 40 % geschädigter Pflanzen bis BBCH 12 empfohlen.



## RÜBENFLIEGE

Die Fliege ähnelt der Stubenfliege. Sie legt Eipakete auf der Blattunterseite ab. Die Larven fressen in den Blättern, es bilden sich Minen und Blasen, die das typische Erkennungszeichen sind.

**Bekämpfungsschwellen:** Anteil mit Larven befallener Pflanzen 10% bis BBCH 12; 20% bis BBCH 14; 30% bis BBCH 16

## EULENRAUPEN

Typische Erkennungszeichen: Lochfraß an den Blättern, der bei starkem Befall bis zum Skelettierfraß führen kann und dunkelgrüne Kotkrümel auf den Blättern. Eulenraupen können etwa ab dem Reihenschließen bis zur Ernte auftreten. Mit Insektiziden sind nur die jungen Larvenstadien gut zu bekämpfen.

**Bekämpfungsschwelle:** 1 Raupe/Pflanze oder 10-20 % gefressene Blattfläche; ab Juli 3 Raupen/Pflanze oder 20-30 % gefressene Blattfläche

## RÜBENMOTTE

Mottenbefall ist zunächst nur sehr schwer zu erkennen, da die kleinen 5 mm großen Raupen in den Blattstielen und Rübenherzen versteckt leben. Erst nach dem Einnisten im Rübenherz wird der Befall durch schwarze Gespinste leichter erkennbar. Die Bekämpfung der Raupen ist durch diese „versteckte“ Lebensweise äußerst schwierig. Bekämpfungsversuche mit Insektiziden zeigten nur geringe Erfolge. Insektizide sollten nur bei starkem Befallsdruck mit hoher Wassermenge (mind. 600 l/ha) in Mischung mit einem Netzmittel, z.B. **Silwet Gold** 0,2 l/ha (6 €/ha) oder **Break Thru** 0,2 l/ha (6 €/ha), eingesetzt werden. Auch bei günstigen Behandlungsbedingungen wurden lediglich Wirkungsgrade um 50 % erreicht. Der Befall von Rübenmotten war im Jahr 2022 gegen Ende der Saison in einigen Gebieten mit 100 % einzustufen und zeigte sich durch verbrennte Herzen

Bitte beachten Sie die Warndienste, die aktuellen Hinweise im Internet und das Infotelefon der ARGE.


**Bekämpfungsschwelle:** mehr als 10% Pflanzen mit Befall

## SCHNECKEN

Nach der Saat sollten die Bestände besonders in feuchten Frühjahren und auf Mulchsaatflächen kontrolliert werden. Dazu streuen Sie etwas Schneckenkorn an einigen Stellen im Schlag aus und decken diese mit einem feuchten Sack ab. Die Kontrolle am nächsten Tag zeigt Ihnen, ob Schnecken vorhanden sind und der Schlag sofort abgestreut werden muss oder ob keine Gefahr besteht.

Zugelassen sind: z.B. **Axcela** 7 kg/ha (23 €/ha), **Delicia Schnecken-Linsen** 3 kg/ha (10 €/ha), **Ironmax pro** 7 kg/ha (32 €/ha), **Metarex Inov** 5 kg/ha (20 €/ha), **Sluxx HP** 7 kg/ha (32 €/ha).

HILFE BEI  
DER BESTIMMUNG



# Insektizide gegen Blatt- und Bodenschädlinge

Abstandsauflagen s.S. 43

Handelsname (Zulassung bis) Formulierung s.S. 28		Wirkstoff (g/l bzw. kg) IRAC-Klasse	Aufwandmenge Kosten (Preisliste 2022)	zugelassene Indikation	Bienen- gefähr- dung	Anzahl Anwendungen	Warte- zeit Tage
<b>Pyrethroide, Fraß- und Kontaktwirkung, Anwendung bei unter 25°C</b>							
Decis forte (12.2024)	EC	Deltamethrin (100) 3A	75 ml/ha (4 €/ha)	Moosknopfkäfer	B2	1	-
Karate Zeon (08.2023)	CS	lambda-Cyhalothrin (100) 3A	75 ml/ha (10 €/ha) / 150 g/ha (5 €/ha)	Rübenfliege, <u>beißende</u> & <u>saugende</u> Insekten	B4	2 ab 6-Blattstadium der Rüben	28
Hunter WG (12.2022)	WG						
Lambda WG Lamdex Forte	(50)						
Kaiso Sorbie (12.2023)	EG	lambda-Cyhalothrin (50) 3A	150 g/ha (5 €/ha)	Rübenfliege, <u>saugende</u> Insekten	B4	1	28
Bulldock Top							
Shock Down (07.2023)	EC	lambda-Cyhalothrin (50) 3A	150 ml/ha (6 €/ha)	Erdflöhe, Rübenfliege, Erdräupen	B2	2	56
<b>Carboxamide, Fraß-, Kontakt- und systemische Wirkung</b>							
Teppeki Afinto (08.2024)	WG	Flonicamid (500) 9C	140 g/ha (30 €/ha)	Blattläuse	B2	1 ab 6-Blattstadium der Rüben	60

Die Preisangaben in den Tabellen sind nur Orientierungswerte. Sie sind der Netto-Preisliste Frühjahr 2022 entnommen. **Bienenaufgaben:** B1 Mittel ist bienengefährlich, B2 Mittel ist bienengefährlich, außer bei der Anwendung nach dem Ende des täglichen Bienenfluges in dem zu behandelnden Bestand bis 23.00 Uhr (MEZ), B4 Mittel ist nicht bienengefährlich. Über weitere Mittelzulassungen (reguläre oder Notfallzulassung) werden wir zeitnah informieren.



# UNKRAUT BEKÄMPFUNG

Die relativ kalte Witterung im Frühjahr 2022 stellte die Landwirte bei der Wahl der Herbizidmischungen vor Herausforderungen. Es galt die richtige Mittelmenge bzw. Mittelkombination zu finden. Dank der noch im Frühjahr vorhandenen Niederschläge war die Unkrautwirkung zumeist gut.

Zur Unkrautbekämpfung im Nachauflauf werden Kombinationen aus blatt- und bodenaktiven Wirkstoffen gemischt. Beste Erfolge sind im Keimblattstadium der Unkräuter zu erzielen. Die Rübengröße spielt für den Anwendungstermin keine Rolle.

Vorteil der Nachauflaufbehandlung ist, dass die Mittelkombination an die vorhandene und erwartete Verunkrautung angepasst werden kann.

Bei „normalen“ Behandlungsbedingungen werden mit der Grundmischung (Seite 28) hohe Wirkungsgrade erzielt. Voraussetzung:

 Unkräuter im Keimblattstadium

 Temperaturen zwischen 5 und 20°C

 mittlere Bodenfeuchtigkeit

Infos zu Conviso Smart finden Sie auf Seite 30-31.



## UNTER ABWEICHENDEN BEDINGUNGEN

werden die Mittelmengen bzw. Komponenten angepasst. Die Grundmischung besteht aus einer blattaktiven Komponente (dem Wirkstoff Phenmedipham) und den Bodenherbiziden Ethofumesat und Metamitron (z.B. Oblix, Tramit bzw. Goltix Gold, Metafol SC) abhängig von der Verunkrautung.

## AUF FELDERN MIT PROBLEMUNKRÄUTERN


kommen zusätzlich zur Grundmischung, üblicherweise ab der 2. NAK, passende Spezialherbizide zum Einsatz. Zur Bekämpfung von Problemunkräutern werden Debut, Debut DuoActive (Pack), Lontrel, Tanaris, Spectrum oder Venzar zugemischt. Weiterhin ist es bei Problemunkräutern in vielen Fällen sinnvoll, die Menge des Bodenherbizids zu erhöhen.


## WIRKUNGS- DAUER

Für eine ausreichende Wirkungsdauer sollten in der Summe der Applikationen mindestens 2100 bis 2800g Metamitron (entsprechen 3 - 4 l/ha Goltix Gold, Metafol SC, Nymeo oder 4 - 5 l/ha Goltix Titan) eingesetzt werden.

# RESISTENZ- MANAGEMENT

Um einer Herbizidresistenz vorzubeugen, sollten möglichst Wirkstoffe mit unterschiedlichen Wirkmechanismen kombiniert werden. Die Wirkstoffe sind in Wirkungsklassen (HRAC/WSSA) eingeteilt, diese sind mit Buchstaben (z.B. A, B, C1 etc.) bzw. mit Zahlen gekennzeichnet. Unterschiedliche Buchstaben/Zahlen kennzeichnen unterschiedliche Wirkmechanismen. Um Resistenzbildungen bei den Unkräutern bzw. Gräsern zu vermeiden, sollten nach Möglichkeit Mittel mit unterschiedlichen Buchstaben kombiniert werden. Dies sollten Sie auch bei Spritzungen im Rahmen der Fruchtfolge beachten und einen entsprechenden Produktwechsel einplanen. Der Wechsel von Wirkungsklassen ist bei der Gräserbekämpfung besonders wichtig, aber auch schwierig. Alle Gräserherbizide in Zuckerrüben sind in die gleiche HRAC/WSSA-Klasse eingetragen, deshalb sollten in der Fruchtfolge möglichst Mittel aus anderen Klassen verwendet werden. Die „**Dim-Präparate**“ **Focus Ultra** und **Select** zeigten, trotz gleicher HRAC/WSSA Einstufung, Vorteile bei der Gräserbekämpfung auf Standorten mit resistenten Arten. Sie werden daher auf gefährdeten Standorten bevorzugt empfohlen.

**Fruchtfolge**   
auch hier sollten möglichst  
Mittel aus unterschiedlichen  
Klassen verwendet werden

**Wirkstoffwechsel**   
Einsatz von Wirkstoffen mit  
unterschiedlichen  
Wirkmechanismen

# Mittelübersicht Abstandsaufgaben s. S. 44

Handelsname: (Zulassung bis)	Wirkstoff HRAC <sup>1</sup> / WSSA g/l				Aufwand- menge l,g/ha	Preis €/ha Preis- liste 2022	max. zugel. Menge l/ha / Anzahl Anwendungen	Wirkung (+++ = sehr gut, ++ = gut, + = befriedigend, - = schwach)										Besonder- heiten
	Formlierung s.S. 34							Gänsefuß / Meide	Kletten- labkraut	Kamille	Wind- knöterich	Vogel- knöterich	Bingel- kraut	Amarant	Nacht- schatten	Hunds- petersilie		
<b>Blattherbizide</b>																		
Belvedere Duo (07.2024)	SC	200	200		1,0-1,3	27 - 36	4,0 / 3	++(+)	++	+	++	+(+)	++(+)	+(+)	++(+)	+	plus Hasten 0,3-0,5 oder Mero 1,0 l/ha 3 – 6 €/ha	
Betanal Tandem <sup>2</sup> (07.2024)	SC	200	190		1,0-1,5	24 - 36	4,0 / 3	++(+)	++	+	++	+(+)	++(+)	+(+)	++(+)	+		
Betasana SC (07.2023)	SC	160			1,25-2,0	16 - 25	6,0 / 3	++	+	-	+	+	-	+	+	-		
<b>Bodenherbizide</b>																		
Goltix Gold (08.2023)	SC	700				28 - 55	5,0 / 3											
Metafol SC (08.2023)	SC	696			1,0-2,0	26 - 52	6,0 / 3 VA/NA 2x	+++	+	++(+)	+	++		++	++(+)	+(+)		
Nymeo (08.2023)	SC	696					6,0 / 3 VA/NA 2x											
Goltix Titan (08.2023)	SC	525		40	1,3-2,0	46 - 71	6,0 / 3 NA 4 VA/NA 3x	+++	+++	++(+)	++	++	-	++	++(+)	++	max. 250 g Quin- merac/ha und Jahr	
Kezuro (08.2023)	SC	571		71	0,9 / 1,3 1./2.3.NAK	27 - 40	3,5 / 3	++(+)	+++	++(+)	++	++	-	++	++(+)	++		
Tanaris <sup>4</sup> (10.2023)	SE	Dimethenamid K3./ 15 333		167	0,3 / 0,6 1./2.3.NAK	14 - 28	1,5 / 3	+(+)	++	+	+	(+)	+	+(+)	++	++	Tanaris: Hirse ++(+)	
Oblix/Tramat 500 (10.2032)/(10.2032)	SC		500		0,3-0,66	8 - 18	2,0 / 3	+	+++	-	++	+	+++	+(+)	+	-		
Metafol Super (08.2023)	SE	350	150		2,0		6,0 / 3	++(+)	+++	++	++	++	++	++	++	++		
Venzar 500 SC (12.2024)	SC			500	0,25-0,5	10 - 21	1,0 / 4	+(+)	+	++	++	+(+)	++	++	++(+)	+(+)	max. 500 g Lenacil in 3 Jahren	
<b>Spezialherbizide</b>																		
Debut / Shiro <sup>3</sup> /Kaskad (12.2024 /12.2023/12.2023)	WG	500			20-30 g	20 - 30	90g / 3 Shiro 120g/4	-	+++	+++	(+)	++(+)	+++	++(+)	+(+)	++(+)		
Debut DuoActive (12.2023)	WG	71		714	160-210 g	24 - 32	630 g / 3	++	+++	+++	+(+)	++(+)	+++	+++	++(+)	++(+)		
Lontrel 600/Cliophar (04.2023)	SL		600		0,2	47	0,2 / 2											
Lontrel 720 SG (12.2023)	SG		720		167 g	53	167g / 2	-	-	+++	++(+)	-	-	-	++(+)	++(+)	Disteln +++	
Vivendi 100 (12.2023)	SL		100		1,2	50	1,2 / 2											
Spectrum <sup>4</sup> (04.2023)	EC			720	0,9	30	0,9 / 1	+(+)	(+)	++	+	(+)	+	++	++(+)	++	Hirse ++(+)	
<b>Conviso Smart</b>																		
Conviso One <sup>5</sup> (09.2025)	SC	50	30		0,5		1,0 / 2	+++	+++	+++	++	+++	+++	+++	+++	+++	plus Mero 0,5 l/ha	

<sup>1</sup> Einteilung der Wirkstoffe in Wirkungsklassen (HRAC/WSSA). Neue Bezeichnung WSSA (Weed Science Society of America). Zur Vermeidung von Herbizidresistenzen möglichst die Klassen wechseln.

<sup>2</sup> Betanal Tandem in der 1.NAK max. 1,0 l/ha, in der 2. und 3. NAK max. 1,5 l/ha. Vorgeschriebene Mischung mit Mero 1,0 l/ha. <sup>3</sup> Shiro zugelassene Aufwandmenge 4\*30 g/ha <sup>4</sup> Spectrum und Tanaris haben eine gute Bodenwirkung gegen Hirsearten. Bereits aufgelaufene Hirsen werden nicht sicher erfasst, ggf. Gräserherbizid anwenden. <sup>5</sup>Conviso Smart: Conviso One wird von uns nur in der Anwendung mit 2 x 0,5 l/ha empfohlen (BVL-Anwendungsnummer: 008430-00/00-002). Mit jeder Behandlung wird die gleiche Menge an Mero mitausgebracht. Mehrere Infos zu Conviso Smart auf Seite 30/31. Das Herbizid von Bayer wird nur zusammen mit Conviso Saatgut von KWS vertrieben.

# Empfehlungen zum Herbizideinsatz im Keimblattstadium der Unkräuter

**GRUNDMISCHUNG** (l/ha) für „normale Verunkrautung“ im Keimblattstadium, ohne schwerbekämpfbare Unkrautarten

BLATTAKTIVE KOMPONENTE			BODENHERBIZIDE			WIRKUNGS- UNTERSTÜTZUNG	
Belvedere Duo <sup>1</sup>	1,25	+	Goltix Titan <sup>1</sup>	1,5 - 2,0	+	Hasten	0,3 - 0,5
Betanal Tandem	1,25 <sup>2</sup>		Metafol SC Goltix Gold Nymeo	1,0 - 1,5		Mero, Access	0,5 - 1,0 0,5 - 1,0
Betasana SC + Oblix <sup>3</sup>	1,5 + 0,5		Kezuro <sup>4</sup>	0,9 / 1,3 / 1,3		oder Additiv	
Betasana SC	1,5	+	Mefafol Super <sup>4</sup>	2,0		Kantor	015 % <sup>5</sup>

<sup>1</sup> auch im **Goltix Titan Belvedere Pack** bestehend aus Belvedere Duo 7,5 l und Goltix Titan 10 l

<sup>2</sup> Betanal Tandem in der 1.NAK maximal 1,0 l/ha zugelassen; vorgeschriebene Mischung mit Mero 1,0 l/ha

<sup>3</sup> auch im **Betasana Perfekt Pack** bestehend aus Betasana SC 15 l und Oblix 5 l

<sup>4</sup> zur 3.NAK um Metafol SC 1,0-2,0 l/ha ergänzen

<sup>5</sup> Kantor wird 0,15 %ig eingesetzt (z.B.: 0,3 l/ha bei 200 l Wasser)

## ZUSÄTZLICHE HINWEISE

In der Kombination der Grundmischung plus Debut sind 2 Wirkungsverstärker (Wirkungsunterstützung & Trend/FHS) enthalten. Um Kulturschäden zu vermeiden, empfehlen wir unter „normalen“ Bedingungen den Wirkungsunterstützer wegzulassen und Trend/FHS mit 0,25 l/ha zuzusetzen. Haben die Unkräuter eine ausgeprägte Wachsschicht empfiehlt sich der Zusatz eines Additives wie z.B. Kantor (volle Aufwandmenge: 0,3 l / 200 l Wasser) oder die halbe Menge eines Formilierungshilfsstoffs (mit z.B. Hasten, Mero, Access). Beachten Sie den aktuellen Stand der Zulassung!

Bei zu erwartender Spätverunkrautung (Amarant, Nachtschatten, Gänsefuß) die Goltixmenge in der 2. und 3. NAK erhöhen. In kritischen Witterungsphasen (Nachtfrost, geringe Wachsschicht) kann es beim Herbizideinsatz zu Kulturschäden kommen (Beratung einholen).

**Problemunkräuter** zur sicheren Bekämpfung von Problemunkräutern werden zur Grundmischung folgende „Spezialherbizide“ zugemischt. Der Zusatz erfolgt meist ab der 2. NAK. Es sollten in der Regel nicht mehr als 3 Mittel kombiniert werden.

Problemunkraut	Grundmischung +					
	Debut <sup>1</sup> / Shiro / Kaskad	Debut DuoActive <sup>1</sup> (Pack) <sup>2</sup>	Lontrel 600 / Vivendi 100	Tanaris <sup>4</sup>	Spectrum <sup>3</sup>	Venzar
	überwiegend Blattwirkung			überwiegend Bodenwirkung		
Amarant	30 g/ha	210 g/ha	-	0,6 l/ha	0,3-0,45 l/ha	0,3 l/ha
Bingelkraut	20 – 30 g/ha	160 - 210 g/ha	-	-	-	0,25 l/ha
Hundspetersilie	25 – 30 g/ha	160 - 210 g/ha	0,1 l/ha / 0,6 l/ha	0,6 l/ha	0,3 l/ha	-
Kamille	25 – 30 g/ha	160 - 210 g/ha	0,1 l/ha / 0,6 l/ha	0,6 l/ha	-	0,25 l/ha
Klettenlabkraut	25 – 30 g/ha	160 - 210 g/ha	-	-	-	-
Vogelknöterich	30 g/ha	210 g/ha	-	-	-	0,25 l/ha
Windenknöterich			0,1 l/ha / 0,6 l/ha			
Ausfallraps <sup>5</sup>	20 – 30 g/ha	160 - 210 g/ha	-	-	-	-

<sup>1</sup> Debut und Debut DuoActive werden in Kombination mit Trend (FHS) 0,16 – 0,25 l/ha eingesetzt

<sup>2</sup> der Debut DuoActive Pack enthält die Einzelkomponenten Debut 120 g, Venzar 500 l und Trend (FHS) 1 l für 4 ha. Der Pack ist wirkungsgleich mit der Fertigformulierung.

<sup>3</sup> für die Solo-Anwendung von Spectrum besteht eine Zulassung ab dem 6-Blattstadium der Rüben

<sup>4</sup> bei Spritzfolgen mit Tanaris, Goltix Titan oder Kezuro auf die Quinmerac-Menge achten. Max. 250 g/ha und Jahr

<sup>5</sup> bei Ausfallraps kann der Zusatz von Debut / Shiro (20 g/ha + 0,2 FHS) bereits zur 1. NAK sinnvoll sein

**DISTELN** werden mit Lontrel 600 0,2 l/ha (Cliophar 600 0,2 l/ha, Vivendi 100 1,2 l/ha oder Lontrel 720 SG 165 g/ha) bei einer Wuchshöhe von ca. 15-20 cm gut erfasst. Es ist darauf zu achten, dass noch keine Blütenknospen gebildet wurden.

Bei starkem Distelbesatz hat sich die Splittingspritzung von zweimal 0,1 l Lontrel 600 (0,6 l/ha Vivendi 100; 80 g/ha Lontrel 720 SG) plus Additiv wie Kantor (0,3 l / 200 l Wasser (Spritzbrühe)) bei einer Wuchshöhe von 10 cm bewährt. Die Wirkung wird durch wüchsige Witterung gefördert.

# CONVISO SMART.

Die etwas andere Unkrautbekämpfung

**DAS SYSTEM:** Die Züchter liefern Zuckerrübensorten, die gegen ALS-Hemmer resistent sind. Bayer liefert das Herbizid Conviso One. Dieses bietet ein breites Unkrautwirkungsspektrum, weniger Applikationen und beste Kulturverträglichkeit. Die Unkrautbekämpfung erfolgt in nur 2 Behandlungen und deckt alle wesentlichen Unkräuter und Ungräser ab.



## SAATGUT

Zuckerrübensorten, die resistent gegenüber ALS-Hemmer sind



## HERBIZID

Herbizid CONVISO® ONE mit breitem Unkrautwirkungsspektrum

## ANWENDUNG

Conviso One besteht aus 2 Wirkstoffen. **Foramsulfuron** (50g/l), welches vorrangig blattaktiv ist & **Thiencarbazone-methyl** (30g/l), was sowohl boden- als auch blattaktiv ist.

Die **jährlich** zugelassene **Aufwandmenge liegt in Deutschland bei 1 l/ha**. Die Anwendung kann als **Flächenbehandlung mit 1x 1l/ha oder 2x 0,5l/ha** erfolgen, allerdings nur auf undrainierten Flächen. Auf drainierten Flächen darf diese Aufwandmenge nur als Bandspritzung im Hacke-Band-System ausgebracht werden. Da bei der Bandspritzung nur 45 % der Fläche behandelt werden, wird die Wirkstoffmenge dementsprechend reduziert. Zur Absicherung der Wirkung wird die gleiche Menge Mero als Wirkungsunterstützung mitausgebracht.

## GUTE WIRKUNG AUCH GEGEN SCHWER BEKÄMPFBARE UNKRÄUTER

Spezialherbizide gegen hartnäckige Unkräuter werden nicht benötigt. Es werden Hundspetersilie, Samtpappel, Hirse, Knötericharten, Bingelkraut etc. gut erfasst.

**SCHOSSERMANAGEMENT:** Das System eignet sich sehr gut, um Flächen, auf denen ein konventioneller Zuckerrübenanbau nicht mehr möglich ist, wieder zu aktivieren. Conviso-Schosserrüben sollten bei Sichtbarwerden sofort entfernt werden, da Smart-Wildrüben nicht mit ALS-Hemmern bekämpft werden können.

**DURCHWUCHSRÜBEN:** Durchwuchsrüben, die in der Folgekultur noch lebensfähig sind, sollten so früh wie möglich bekämpft werden. Sollten Durchwuchsrüben in der Folgekultur Winterweizen stehen, können diese nach dem Aufstängeln mit Wuchsstoffen (MCPA; Fluroxypyr) bekämpft werden.

#### **RESISTENZMANAGEMENT IN DER FRUCHTFOLGE:**

Resistenzmanagement hat bei der noch vorhandenen Wirkstoffpalette am Markt höchste Priorität. Sollten Conviso Rüben angebaut werden, dürfen im Folgejahr keine Sulfonylharnstoffe in den Einsatz kommen (Atlantis, Broadway etc.). Keinen Einsatz von Conviso One, wenn das Resistenzmanagement nicht händelbar ist.

**NACHBAUKULTUREN: Nach Umbruch (Frost / Verschlammung)** ist ein direkter Nachbau einer Smart Zuckerrübensorte möglich, der Anbau von Mais nach einer sauberen Pflugfurche oder ALS-toleranten Sonnenblumen möglich. **Zur Herbstaussaat** ist die Aussaat von Winterweizen oder Wintertriticale möglich. **Zur Frühjahrssaat** im darauffolgenden Jahr eignen sich alle reinen Ackerbaukulturen (Gemüse ausgeschlossen). Bei Kartoffeln und Sommerraps ist die Wartezeit von 12 Monaten nach der Applikation von Conviso One einzuhalten.

**SORTENWAHL:** Zurzeit stehen 3 Sorten von KWS auf dem deutschen Markt zur Verfügung. Da die Sorten bei SBR nur geringe Leistung zeigen, sollte kein Anbau des Conviso Systems in SBR-Gebieten erfolgen.

**EMPFEHLUNG:** Conviso One ist neu auf dem Markt, es liegen noch keine mehrjährigen Praxiserfahrungen vor. Setzen Sie dies in Ihrem Betrieb ein, empfehlen wir die zweimalige Applikation von 0,5 l/ha Conviso One mit 0,5l/ha Mero auf undrainierten Flächen. Auf drainierten Flächen im Hacke-Band-System wird die Menge dementsprechend auf 45 % reduziert. Der Mindestabstand zwischen der ersten und zweiten Applikation beträgt 10 Tage. Der Anwendungszeitpunkt entscheidet über die höchste Wirksamkeit, dabei wird sich immer an der Größe des weißen Gänsefuß orientiert. Der höchste Wirkungsgrad wird bei einer Behandlung im 2-Blatt-Stadium erreicht.

CONVISO SMART SYSTEM







WEITERE  
FAKTEN

# BEKÄMPFUNG VON UNGRÄSERN

Der beste Behandlungstermin liegt zwischen 3-Blatt-Stadium und Bestockungsbeginn der Gräser. Wichtig ist, dass möglichst alle Gräser aufgelaufen sind, da keines der Gräserherbizide über eine Bodenwirkung verfügt. Der zeitliche Abstand zu einer Unkrautbehandlung sollte in der Regel ca. 3 Tage betragen. Die Gräserherbizide unterscheiden sich in Wirkungsbreite und –geschwindigkeit bei empfindlichen Gräserarten nur geringfügig.

Wenn bereits resistente Ungräser (Ackerfuchsschwanz, Windhalm oder Flughafer) aufgetreten sind, sollten bevorzugt Dim´s (Produkte: Focus Ultra oder Select 240) verwendet werden. Mit diesen Mitteln sind unter Umständen höhere Wirkungsgrade zu erzielen.

## AUF GÜNSTIGE WIRKUNGSBEDINGUNGEN ACHTEN:

-  wüchsiges Wetter
-  hohe Luftfeuchtigkeit
-  Gräser mit mind. 3 (aber noch vor Bestockungsbeginn)
-  volle Aufwandmenge der Gräserherbizide applizieren





Mittel (Zulassung bis)	Formulierung Info S. 34	Wirkstoff (g/l)	HRAC/WSSA-Klasse	Aufwand- menge l/ha Gräser Kosten (Preisliste 2022)	Quecke l/ha Kosten (Preisliste 2022)	Wirkung auf Gräser +++ = sehr gut, ++ = gut, + = befriedigend, - = schwach						
						Ackerfuch- schwanz, Flughafel, Windhalm, Hirsens	Trespen	Ausfall- getreide	Einj. Risp	Quecke	Anz. Anwen- dungen	Wartezeit Tage
Agil S (11.2024) Zetrola (11.2024)	EC	Propaquizafop (100)	A/1	0,75- 1,0 (20-26 €/ha)	Agil S 1,5 (40 €/ha)	+++	++	+++	-	++	1	F
Focus Ultra + Dash EC <sup>1</sup> (12.2025)	EC	Cycloxydim (100)	A/1	0,75-1,75 +1,0 (18- 30 €/ha)	1,5-2,5 + 1,0 (35-60€/ha)	+++ 0,75-1,25 l/ha	++ 1,0- 1,75 l/ha	+++ 1,0-1,75 l/ha	-	++	1	56
Fusilade Max (12.2024)	EC	Fluazifopp-butyl (125)	A/1	0,75-1,0 (25-33 €/ha)	2,0 (66 €/ha)	+++	++	+++	-	+++	1	90
Panarex (11.2024)	EC	Quizalofop-P (32)	A/1	1,0-1,25 (14-17 €/ha)	2,25 (31 €/ha)	+++	++	+++	-	+++	1	60
Select 240 EC + Radiamix (12.2024)	EC	Clethodim (240) + Öl	A/1	0,5-0,75 + 1,0 (24-28 €/ha)	1,0 + 1,0 (33 €/ha)	+++	+++	+++	+	+++	1	F
Targa Super (11.2024) GramFix (11.2024) Leopard (11.2023) Targa Max (11.2024)	EC	Quizalofop-p-Ethyl (46,3) (92,5)	A/1	0,75-1,25 (10-17 €/ha) 0,4 – 0,6	2,0 (27 €/ha) 1,25	+++	++	+++	-	++	1	60 Leo- pard 100

<sup>1</sup> Focus Ultra + Dash EC = Focus Aktiv-Pack. Dash ist ein Formulierungshilfsstoff zur Wirkungsverstärkung. Dash nur bei der Solo-Gräserbehandlung einsetzen!


### KOMBINIERTER SPRITZUNG VON UNKRÄUTERN UND GRÄSERN:

Bei flächigem Auftreten von Gräsern bietet sich eine Tankmischung mit den Unkrautherbiziden an. In diesen Fällen wird der zweimalige Einsatz von jeweils ca. 50 % der üblichen Aufwandmenge des Gräserherbizids empfohlen. Zu dieser Tankmischung (Unkraut- und Gräserherbizid) keine weiteren Zusätze (Öl, Debut, Lontrel, Spectrum oder Insektizid) hinzufügen. Der Spritztermin wird immer von den Unkräutern bestimmt. **Keine Tankmischungen bei:**

 resistenten Gräsern

 geschwächten Rüben

 Frostgefahr

 geringer Wachsschicht

Aus der Praxis wird immer wieder über Ausflockungen, Schleimbildung oder Ablagerungen besonders an den Düsensieben oder Düsen berichtet. Diese Probleme mit der Stabilität der Spritzbrühe können von vielen Einflussfaktoren wie z.B. Anzahl der Mischpartner, Wasserhärte, Wassertemperatur, Eisengehalt oder Pumpenleistung hervorgerufen werden. Auch die Reihenfolge in der die Mischpartner zugegeben werden, kann einen Einfluss haben.

# MISCHREIHENFOLGE BEI TANKMISCHUNGEN

FOLGENDE REIHENFOLGE WIRD EMPFOHLEN:



Welche Mittel wie formuliert sind, entnehmen Sie den Übersichtstabellen.

Diese Reihenfolge stellt nur eine Empfehlung dar, keinesfalls sollten Sie alle Formulierungsvarianten in einer Spritzbrühe mischen. Die Anzahl der Mischpartner muss auf ein sinnvolles Maß begrenzt bleiben. Im Zweifel ist eine zusätzliche Überfahrt im zeitlichen Abstand vorzuziehen.

# ALTVERUNKRAUTUNG

In milden Wintern entwickeln sich viele Unkräuter z.B. Klettenlabkraut, Kamille und Ehrenpreis so gut, dass eine sichere Beseitigung durch die Saatbettbereitung nicht gewährleistet ist. Bei **Mulchsaat mit Zwischenfruchtanbau** besteht zusätzlich die Möglichkeit, dass die Zwischenfrucht im Winter nicht vollständig abfriert.

Diese Altverunkrautung kann **vor oder nach der Rübensaat** mit glyphosathaltigen Mitteln wie z.B.

**Roundup Ultra** 5 l/ha oder  
einem **anderen Glyphosat-Mittel** 3-4 l/ha

beseitigt werden. Bitte die Anwendungsbereiche der jeweiligen Produkte beachten!

## GRENZEN DER RÜBENHERBIZIDE

Mit den vorhandenen Rübenherbiziden sind **Ackerwinde, Acker-schachtelhalm, Landwasserknöterich, Malven, Samtpappel und Kartoffelaufwuchs** nicht ausreichend zu bekämpfen. Meist sind nur Teilerfolge durch „Abbrennen“ des Blattapparates zu erreichen. Die Pflanzen erholen sich nach kurzer Zeit und wachsen weiter. Zur Vermeidung von Unkrautproblemen ist der Bekämpfung dieser Unkrautarten im Rahmen der Fruchtfolge besondere Aufmerksamkeit zu schenken.



### ACHTUNG AUFLAGE NG 352

Bei der Anwendung des Mittels ist ein Abstand von 40 Tagen zwischen den Spritzungen einzuhalten, wenn der Gesamtaufwand von zwei aufeinanderfolgenden Spritzanwendungen mit diesem und anderen glyphosathaltigen Pflanzenschutzmitteln die Summe von 2,9 kg Glyphosat/ha überschreitet.

# BLATT- KRANKHEITEN

Durch die Trockenheit war der Cercosporabefall 2022 recht verhalten. Die heißen Temperaturen über 30 °C bremsten Cercospora außerhalb der Beregnungsgebiete aus. Lediglich mit Bewässerung wurde der Druck an Pilzkrankheiten durch die Bildung eines feuchten Mikroklimas erhöht. In Beregnungsgebieten erfolgten somit teilweise 3 Behandlungen, während ohne Bewässerung teilweise eine oder gar keine Behandlung erfolgte.

In den Gebieten mit starkem Cercosporabefall weisen die Strobilurine keine Wirkung mehr auf. In diesen Regionen müssen Azol-Spritzfolgen eingesetzt werden, die mit einem Kontaktfungizid (z.B. Funguran Progress + Yukon etc.) kombiniert werden sollten, soweit eine Zulassung erteilt wird. Wir werden im Warndienst über die aktuelle Zulassungssituation informieren. Nutzen Sie dann die Möglichkeit und verwenden sie Produkte aus der Notfallzulassung, da Tetra- und Difenoconazol ebenfalls hoch resistenzgefährdet sind.

Überall wo die Strobilurine noch wirken, sollte die erste Behandlung mit einem strobilurinhaltenen Fungizid bzw. Mittelkombination begonnen werden. Zur Folgespritzung werden dann Azole eingesetzt.



## SCHWELLENWERTE ZUM EINSATZ VON FUNGIZIDEN:

### 1. FÜR DIE ERSTBEHANDLUNG

bis Ende Juli	5% befallene Blätter
01. – 15. August	15% befallene Blätter
ab 16. August	45% befallene Blätter

### 2. FÜR DIE ZWEITBEHANDLUNG

ca. 2 – 4 Wochen nach der Erstbehandlung:	
bis 15. August	15 % befallene Blätter
ab 16. August	45 % befallene Blätter

### FÜR DIE FOLGEBEHANDLUNG

45 % befallene Blätter



### KONTROLLE:

100 Blätter werden aus der mittleren Blattetage entnommen. Jedes Blatt mit Befall durch Cercospora, Ramularia, Mehltau oder Rübennrost wird gezählt. Bei Erreichen des Schwellenwertes sollte der Fungizideinsatz unmittelbar erfolgen.

# Fungizide gegen Blattkrankheiten

Abstandsauflagen s.S. 44

Handelsname (Zulassung bis)  Formulierung Info S. 34	Wirkstoff (g/l bzw. kg)  FRAC-Klasse alt/neu (Kennzeichnung für das Resistenzmanagement)	Aufwand- menge l/ha  Kosten (Preisliste 2022)	zugelassene Indikation	Wirkung auf				Anwend- ungen max. im Abstand von ..Tagen	Warte- zeit Tage
				Cercospora	Ramularia	Mehltau	Rost		
<b>Azole:</b>									
<b>Belanty<sup>3</sup></b> (20.03.2030) SC	Mefentrifluconazole (75) G1/3	<b>1,5</b> (- €/ha)	Cercospora, Ramularia, Mehltau, Rost	++	++	++	++	2 min. 14	28
<b>Domark 10</b> (12.2024) EC EC	Tetraconazole (100) G1/3	<b>1,0</b> (27 €/ha)	Cercospora, Ramularia, Mehltau	++	++	++	++	2 21-28	28
<b>Score</b> (12.2024) EC	Difenoconazol (250) G1/3	<b>0,4</b> (32 €/ha)	Cercospora, Ramularia	++	++	+	++	2 10-28	28
<b>Strobilurin (+ Azol):</b>									
<b>Amistar Gold</b> (12.2023) SC	Azoxystrobin (125) C3/11 Difenoconazol (125) G1/3	<b>1,0</b> (42 €/ha)	Cercospora, Ramularia, Mehltau, Rost	++(+) <sup>2</sup>	+++	++	+++	2 mind. 21	35
<b>Ortiva<sup>1</sup></b> (12.2024) SC	Azoxystrobin (250) C3/11	<b>1,0</b> (32 €/ha)	Cercospora	++(+) <sup>1,2</sup>	+++	+	+++	2 14-28	35
<b>Kontaktfungizid:</b>									
<b>Microthiol WG</b> (12.2023) WG	Schwefel (800) M2/M02	<b>7,5</b> (18 €/ha)	Mehltau	-	-	++	-	4 7-14	14

Wirkungen: +++ sehr gut; ++ gut; + befriedigend; - schwach

<sup>1</sup>Ortiva muss immer in Kombination mit einem Azol eingesetzt werden. Unsere Empfehlung: Ortiva 0,5 l/ha + volle Aufwandmenge eines Azol-Produktes.

<sup>2</sup> die dargestellte Cercosporawirkung gilt für Felder OHNE Strobilurinresistenz. Bei Resistenz beruht die Wirkung auf dem Azolanteil.

<sup>3</sup> Belanty ist neu zugelassen und beinhaltet den Wirkstoff Mefentrifluconazole (gleicher Azol-Wirkstoff wie im Produkt Diadem aus der Notfallzulassung). Als neuer Wirkstoff in der Pilzbekämpfung der Zuckerrübe sollte dieser mindestens gleich, bzw. besser wirken als herkömmliche Produkte mit Tetra- bzw. Difenoconazole.

# FÜR EINE ERFOLGREICHE BEHANDLUNG

In **Starkbefallsgebieten** (Beregnung, Tallagen) mit regelmäßig hohem Cercosporabefall wird die **Kombination aus blattgesunden Sorten und schwellenorientiertem Fungizideinsatz dringend** empfohlen. Allerdings ist in SBR-Gebieten der Anbau von Blandina und Inspirea KWS nicht zu empfehlen! Dennoch ist auch bei blattgesunden Sorten der termingerechte Einsatz der Fungizide entscheidend. Die erste Spritzung muss bei Erreichen der Schwellenwerte erfolgen. Diese kann nach unseren bisherigen Erfahrungen, bei den Sorten der CR+ Genetik (Blandina KWS, Inspirea KWS) deutlich später erreicht werden, als bei den anderen Sorten. Einsparpotential besteht auch bei der letzten Behandlung.

Für den Behandlungserfolg sind folgende Punkte wichtig:

BEHANDLUNGSTERMIN & ANBAU VON BLATTGESUNDEN




**TEMPERATUR:** Spritzung unter 25°C. An heißen Sommertagen in den frühen Morgenstunden (ein leichter Taubelag ist positiv) oder am späten Abend bei nicht zu hoher Temperatur spritzen



**ERSTBEHANDLUNG**  
unmittelbar bei Erreichen der Behandlungsschwelle



**AUFWANDMENGE**  
Fungizide in voller Aufwandmenge einsetzen



**STROBILURINE**  
(wo noch wirksam) nur einmal in der Spritzfolge (zur ersten Behandlung) einsetzen



**AZOLE**  
möglichst in Kombination mit Kontaktmitteln, sofern zugelassen, einsetzen



**MITTELWECHSEL**  
bei Mehrfachbehandlungen



**WASSERAUFWANDMENGE**  
300 – 400 l/ha

# Spritzfolge zur Fungizidbehandlung

	Strobilurine wirken nicht mehr	Strobilurine wirken noch	+ Zusatz von Kontaktfungiziden
1. Behandlung	Belanty 1,5	Amistar Gold 1,0 oder Ortiva 0,5 + Azol volle Menge	Falls eine Notfallzulassung für ein Kontaktfungizid erteilt wird, sollte dies auf Starkbefallsstandorten zugesetzt werden. Über die genauen Anwendungsbestimmungen informieren wir Sie umgehend. z.B: + Funguran Progress 1,25 kg/ha oder Yukon 3,0 l/ha
2. Behandlung	Domark 1,0	Belanty 1,5 oder Domark 1,0	
3. Behandlung	Score 0,4 + Dash 0,8	Score 0,4 + Dash 0,8	

Der Zusatz eines Additives wie z.B. Kantor mit 0,3 l / 200 l Wasser wirkt sich positiv auf die Benetzung aus, vorallem bei ungünstigen Witterungsbedingungen.

**ACHTUNG:** Dash darf in Kombination mit Fungiziden mit 0,8 l/ha max. 3 mal angewendet werden.

# EMPFOHLENE DÜSEN

**Injektordüsen** sind Stand der Technik. Sie werden als einfache Flachstrahldüsen oder als Doppelflachstrahldüsen angeboten. Mit diesen Düsen werden die Anforderungen an eine abdriftarme Ausbringung der Pflanzenschutzmittel erfüllt. So können die erforderlichen Mindestabstände zu Gewässern und Saumbiotopen eingehalten bzw. verringert werden. Doppelflachstrahldüsen weisen in vielen Fällen eine bessere und gleichmäßigere Benetzung auf.

Das aktuelle Verzeichnis der verlustmindernd anerkannten Düsen finden Sie unter:

<https://www.julius-kuehn.de/at/ab/abdrift-und-risikominderung/abdriftminderung/>

## SPRITZENREINIGUNG

Immer wieder sind Kulturschäden durch unzureichend gereinigte Spritzen zu beobachten. In der Regel sind diese Schäden vermeidbar, wenn das Gestänge nach jeder Behandlung leer gespritzt und gespült wird, um Ablagerungen in den Leitungen zu verhindern. Beim Wechsel der Kultur ist eine intensivere Reinigung des Behälters, der Leitungen und Filter notwendig.



Für die **UNKRAUTBEKÄMPFUNG** haben sich Düsen der Größen 025 und 03 mit Wasseraufwandmengen von 200 l/ha bewährt.



Für den Einsatz im **FUNGIZID- UND INSEKTIZIDBE-REICH** sind zur besseren Benetzung und Bestandesdurchdringung die Größen 04 und 05 mit ca. 400 l/ha zu verwenden.



Zur Reinigung werden die Spezialprodukte **All clear extra (0,5 %)**, **Agroclean (0,1 %)** oder **Agroquick (2 %)** empfohlen. Melkmaschinenreiniger z.B. **P3** eignet sich nur bei Sulfonylharnstoffen.



Die **Reinigung muss immer auf dem Feld durchgeführt werden**. In jedem Fall ist ein Eintrag der Reinigungsflüssigkeiten in die Kanalisation zu vermeiden!



# AUFLAGEN ZUM PFLANZENSCHUTZ

**ABSTÄNDE ZU ANWOHNERN UND UMSTEHENDEN:** Anwender müssen zu unbeteiligten Dritten (Anwohner und Umstehende) einen **Mindestabstand von 2 m bei Spritzanwendungen in Flächenkulturen** einhalten. Diese Mindestabstände gelten zu Flächen, die für die Allgemeinheit bestimmt sind (§17 des Pflanzenschutzgesetzes; z.B. öffentliche Parks und Gärten, Grünanlagen an öffentlichen Gebäuden, Sport- und Golfplätze, Schul- und Kindergartengelände, Spielplätze, Friedhöfe, Einrichtungen des Gesundheitswesens, privat genutzte Gärten und zu unbeteiligten Dritten, die z.B. einen Weg benutzen. Der Mindestabstand ist auch dann einzuhalten, wenn sich zum Zeitpunkt der Behandlung dort keine Personen aufhalten.) **Zu Feldwegen, Radwegen, Brachflächen etc.** müssen diese Abstände **nicht** eingehalten werden. Es genügt die Spritzarbeit bei Anwesenheit von Personen zu unterbrechen.



**ARBEITSZEIT** unter Umständen die Begrenzung der täglichen Arbeitszeit auf 2 Stunden

## ANWENDUNGSBESTIMMUNGEN zum Schutz von Arbeitern bei Nachfolgearbeiten

Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) wird bei der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln künftig neue Anwendungsbestimmungen zum Schutz von Arbeitern bei Nachfolgearbeiten erteilen. Diese neuen Vorschriften sind differenzierter und berücksichtigen die Wiederbetretungsszenarien für verschiedene Kulturen. Die Vergabe der neuen Auflagen erfolgt ab sofort und sukzessive bei neu zugelassenen oder genehmigten Pflanzenschutzmitteln. Eine systematische Anpassung bestehender Zulassungen ist nicht vorgesehen.

Generell gilt, dass nach Spritz- oder Sprühanwendungen die behandelten Flächen erst nach dem Abtrocknen des Pflanzenschutzmittelbelages wieder betreten werden dürfen. Wenn die Risikobewertung im Zulassungsverfahren ergibt, dass auch nach dem Abtrocknen direkte Kontakte zu behandelten Pflanzen ein unvermeidbares gesundheitliches Risiko darstellen, sind besondere Anwendungsbestimmungen einzuhalten. Diese Auflagen enthalten folgende Aspekte:



**SCHUTZAUSRÜSTUNG:** Lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk; Schutzhandschuhe können hinzukommen



**ZEITRAUM** nach dem Abtrocknen, in dem die Schutzausrüstung zu tragen ist - 2 / 7 / 14 / 21 / 28 Tage bzw. bis kurz vor bzw. bis einschließlich Ernte



### KULTURGRUPPEN

für die die Schutzausrüstung gilt - z. B. Gemüse, Obstbaumkulturen oder Ackerbaukulturen

# DOKUMENTATION

## PFLANZENSCHUTZMASSNAHMEN

Alle Pflanzenschutzmaßnahmen **müssen** dokumentiert werden. Hierbei sind die folgenden Aufzeichnungen zu machen.

Die Aufzeichnung des Einsatzgrundes ist keine Pflicht mehr. Es ist jedoch empfehlenswert diesen mit aufzuschreiben. Diese Aufzeichnungen sind CC-relevant und müssen mindestens 3 Jahre, ab Beginn des Folgejahres nach der Behandlung, aufbewahrt werden.



**Wer?**  
Person



**Was?**  
Kultur und Mittel



**Wo?**  
Schlag



**Wie viel?**  
Mittelmenge



**Wann?**  
Datum



**Weshalb?**  
Einsatzgrund

# Abstandsauflagen zu Gewässern und Saumstrukturen:

Die aufgezeigten Abstandsauflagen entsprechen dem Stand Dezember 2022. Durch gesetzliche Änderungen können zum Zeitpunkt der Anwendung andere Auflagen gelten. Beachten Sie daher die aktuelle Gebrauchsanweisung, Hinweise im Internet unter <https://apps2.bvl.bund.de/psm/jsp/index.jsp>, [www.bisz.suedzucker.de](http://www.bisz.suedzucker.de) (Pflanzenschutz> Pflanzenschutzmittel-Tabellen> Abstandsauflagen) oder in der Fachpresse.

**\* länderspez. Mindestabstand zu Gewässern: Baden-Württemberg 5 m, Hessen 4 m, Rheinland-Pfalz Empfehlung 1 m**

In Baden-Württemberg sind an Oberflächengewässern der Einsatz und die Lagerung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln in einem Bereich von 5 m verboten. Diese Regelung gilt nur an Gewässern von wasserwirtschaftlicher Bedeutung. Auskünfte erteilen die unteren Wasserbehörden bei den Landratsämtern.

**\*\* Abstände sind nicht erforderlich:** - bei angrenzenden landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Flächen, Straßen, Wegen oder - bei angrenzenden Saumstrukturen, die weniger als 3 m breit sind, oder - bei der Anwendung mit tragbaren Pflanzenschutzgeräten. – in Gebieten mit ausreichendem Anteil Kleinstrukturen (siehe <https://www.julius-kuehn.de/sf/ab/raeumliche-analysen-und-modellierung/kleinstrukturen-in-der-agrarlandschaft/>)

Stand: 12/2022

Mittel	Gewässer*						Hangneigung >2%	Saumbiotop**			
	Auf- lage	Abstand zum Gewässer (m), bei Einsatz von Düsen der Abdriftminderungsklasse ..				Auf- lage		Abstand zum Biotop (m), bei Einsatz von Düsen der Abdriftminderungsklasse ..			
		0%	50%	75%	90%			0%	50%	75%	90%
<b>INSEKTIZIDE:</b>											
Bulldock Top	NW 605-1 NW 606	20	10	5	5	-	NT 108	25	25	5	5
Decis forte	NG 405 <sup>1</sup> NW 607-1	kein Einsatz	kein Einsatz	kein Einsatz	15	-	NT 103	20	20	20	0
Hunter WG	NW 605-1	20	10	5	5	-	NT 108	25	25	5	5
Kaiso Sorbie	NW 605-1	20	10	5	5	-	NT 108	25	25	5	5
Karate Zeon	NW 607	kein	10	5	5	-	NT 108	25	25	5	5
Lambda WG	NG 405 <sup>1</sup> NW 607-1	kein Einsatz	kein Einsatz	kein Einsatz	10	-	NT 108	25	25	5	5
Lamdex forte	NW 605-1	20	10	5	5	-	NT 108	25	25	5	5
Shock Down	NW 607	kein	10	5	5	-	NT 108	25	25	5	5
Teppeki - Afinto	-	*	*	*	*	-	-	0	0	0	0

Mittel	Gewässer*					Hang- neigung >2%	Saumbiotop**				
	Auflage	Abstand zum Gewässer (m), bei Einsatz von Düsen der Abdriftminderungsklasse ..					Auflage	Abstand zum Biotop (m), bei Einsatz von Düsen der Abdriftminderungsklasse..			
		0%	50%	75%	90%			0%	50%	75%	90%
<b>FUNGIZIDE:</b>											
Amistar Gold	NW 605-1 NW 606	5	5	*	*	-	-	0	0	0	0
Belanty	-	*	*	*	*	-	-	0	0	0	0
Domark 10 EC	-	*	*	*	*	-	-	0	0	0	0
Microthiol WG	-	*	*	*	*	-	-	0	0	0	0
Ortiva	NW 605 NW 606 NW 705	5	5	*	*	5	-	0	0	0	0
Score	NW 605 NW 606	10	5	5	*	-	-	0	0	0	0
<b>HERBIZIDE:</b>											
Belvedere Duo (3*1,3 l/ha)	NW 609 NW 705	5	*	*	*	5	NT 103	20	20	20	0
Betanal Tandem	NW 609-1 NW 706	5	*	*	*	20	-	0	0	0	0
Betasana SC (3*2 l/ha)	NW 607	kein Einsatz	15	10	5	-	-	0	0	0	0
Cliophar 600 SL	-	*	*	*	*	-	NT 102	20	20	0	0
Conviso One (2*0,5 l/ha)	NG 405 <sup>1</sup> NW 605-1 NW 606 NW 706	5	5	5	*	20	NT 109	25	25	25	5
Conviso One (2*0,25 l/ha)	NW 605-1 NW 606 NW 706 NW 800	5	5	*	*	20	NT 108	25	25	5	5
Debut / Kaskad	NW 609-1	5	*	*	*	-	-	0	0	0	0
Debut DuoActive	NG 405 <sup>1</sup> NW605-1 NW 606 NW 706	5	5	*	*	20	NT 102	20	20	0	0
Goltix Gold	NG 404	*	*	*	*	20	-	0	0	0	0
Goltix Titan	NG 404 NG 343 <sup>3</sup>	*	*	*	*	20	-	0	0	0	0
Kezuro (NA)	NG 343 <sup>3</sup>	*	*	*	*	-	NT 102	20	20	0	0
Lontrel 600/Lontrel 720 SG	-	*	*	*	*	-	NT 102	20	20	0	0
Metafol SC, Nymeo	NG 402	*	*	*	*	10	-	0	0	0	0
Metafol Super	NG 404 NW 609-1 NW 800	5	*	*	*	20	NT 102	20	20	0	0
Oblix (3*0,6 l/ha)	NG 403 NG 404	*	*	*	*	20	NT 101	20	0	0	0
Tanaris	NW 609-1 NG 343 <sup>3</sup>	5	*	*	*	-	-	0	0	0	0
Shiro	NW 605-1 NW 606	10	5	5	*	-	-	0	0	0	0

Mittel	Gewässer*					Hang- neigung >2%	Auflage	Saumbiotop**			
	Auflage	Abstand zum Gewässer (m), bei Einsatz von Düsen der Abdriftminderungsklasse ..						0%	50%	75%	90%
		0%	50%	75%	90%						
<b>Spectrum</b> (0,9 l/ha)	NW 605 NW 606	15	10	5	5	-	NT 101	20	0	0	0
<b>Tramat 500</b> (3*0,66 l/ha)	NG 402 NG 403					10	NT 103	20	20	20	0
<b>Vivendi 100</b>	-	*	*	*	*	-	NT 101	20	0	0	0
<b>Venzar 500 SC</b> (3*0,33) (4*0,25)	NW 605-1 NW 606 NW 706 NW 800 NG 360 <sup>4</sup>	15	10	5	5	20	-	0	0	0	0
		15	5	5	*	20					
<b>GRÄSERHERBIZIDE:</b>											
<b>Agil-S / Zetrola</b> bis 1,0 l/ha	-	*	*	*	*	-	-	0	0	0	0
<b>Agil S</b> 1,5 l/ha	NW 609-1	5	*	*	*	-	-	0	0	0	0
<b>Focus Ultra</b> bis 2,5 l/ha über 2,5 l/ha	-	*	*	*	*	-	NT 101	20	0	0	0
	-	*	*	*	*	-	NT 102	20	20	0	0
<b>Fusilade Max</b> bis 1 l/ha über 1 l/ha	-	*	*	*	*	-	NT 101	20	0	0	0
	-	*	*	*	*	-	NT 103	20	20	20	0
<b>Leopard</b> bis 2,5 l/ha	-	*	*	*	*	-	NT 103	20	20	20	0
<b>Panarex</b> 1,25 l/ha 2,25 l/ha	-	*	*	*	*	-	NT 102	20	20	0	0
	-	*	*	*	*	-	NT 103	20	20	20	0
<b>Select 240 EC</b> 0,75 l/ha 1,0 l/ha	-	*	*	*	*	-	NT 108	25	25	5	5
	-	*	*	*	*	-	NT 109	25	25	25	5
<b>Targa Super, GramFix</b> bis 1,25; <b>Targa Max</b> bis 0,6 l/ha <b>Targa Super, GramFix</b> über 1,25; <b>Targa Max</b> ü. 0,6 l/ha	-	*	*	*	*	-	NT 101	20	0	0	0
	-	*	*	*	*	-	NT 102	20	20	0	0
<b>TOTALHERBIZIDE:</b>											
<b>Roundup Ultra</b>	NG 404	*	*	*	*	20	NT 103	20	20	20	0

<sup>1</sup> NG 405: keine Anwendung auf drainierten Flächen. <sup>3</sup> NG 343: max. 250 g Quinmerac/ha und Jahr <sup>4</sup> NG 360: Innerhalb von 3 Jahren darf die maximale Aufwandmenge von 500 g Lenacil pro Hektar auf derselben Fläche - auch in Kombination mit anderen diesen Wirkstoff enthaltenden Pflanzenschutzmitteln - nicht überschritten werden.

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Diese Broschüre ersetzt nicht die Gebrauchsanleitung der Pflanzenschutzmittel.  
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

# Anwendungsbestimmungen

Kennung	Anwendungsbestimmung	Betroffene Mittel
NG 343	Die maximale Aufwandmenge von 250 g Quinmerac pro ha und Jahr darf – auch in Kombination mit anderen diesen Wirkstoff enthaltenden Pflanzenschutzmitteln – nicht überschritten werden.	Goltix Titan, Kezuro, Tanaris
NG 352	Bei der Anwendung des Mittels ist ein Abstand von 40 Tagen zwischen Spritzungen einzuhalten, wenn der Gesamtaufwand von zwei aufeinanderfolgenden Spritzanwendungen mit diesem und anderen Glyphosathaltigen Pflanzenschutzmitteln die Summe von 2,9 kg Glyphosat/ha überschreitet.	Glyphosat-Mittel
NG 360	Innerhalb von 3 Jahren darf die maximale Aufwandmenge von 500 g Lenacil pro Hektar auf derselben Fläche - auch in Kombination mit anderen diesen Wirkstoff enthaltenden Pflanzenschutzmitteln - nicht überschritten werden.	Venzar 500
NG 402	Zwischen behandelten Flächen mit einer <b>Hangneigung von über 2%</b> und Oberflächengewässern -ausgenommen nur gelegentlich wasserführender, aber einschließlich periodisch wasserführender- muss ein mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsener Randstreifen vorhanden sein. Dessen Schutzfunktion darf durch den Einsatz von Arbeitsgeräten nicht beeinträchtigt werden. Er muss eine <b>Mindestbreite von 10 m</b> haben. Dieser Randstreifen ist nicht erforderlich, wenn – ausreichende Auffangsysteme für das abgeschwemmte Wasser bzw, den abgeschwemmten Boden vorhanden sind, die nicht in ein Oberflächengewässer münden, bzw. mit der Kanalisation verbunden sind oder -die Anwendung im Mulch- oder Direktsaatverfahren erfolgt.	Metafol SC, Nymeo, Trammat 500
NG 404	wie NG 402, aber <b>Mindestbreite 20 m</b>	Goltix Gold, Goltix Titan, Metafol Super, Oblix, Roundup Ultra
NG 403	keine Anwendung auf gedrainten Flächen zwischen dem 01. November und dem 15. März	Oblix, Trammat 500
NG 405	keine Anwendung auf gedrainten Flächen	Conviso One (2x 0,5 l), Debut DuoActive, Decis Forte
NT 101	Die Anwendung des Mittels muss in einer <b>Breite von mindestens 20 m</b> zu angrenzenden Flächen (ausgenommen landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Flächen, Straßen, Wege und Plätze) mit einem verlustmindernden Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ vom 14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung, mindestens in die <b>Abdriftminderungskategorie 50 %</b> eingetragen ist. Bei der Anwendung des Mittels ist der Einsatz verlustmindernder Technik nicht erforderlich, wenn die Anwendung mit tragbaren Pflanzenschutzgeräten erfolgt oder angrenzende Flächen (z. B. Felddraine, Hecken, Gehölzinseln) weniger als 3 m breit sind oder die Anwendung des Mittels in einem Gebiet erfolgt, das von der Biologischen Bundesanstalt im „Verzeichnis der regionalisierten Kleinstrukturanteile“ vom 7. Februar 2002 (Bundesanzeiger Nr. 70a vom 13. April 2002) in der jeweils geltenden Fassung, als Agrarlandschaft mit einem ausreichenden Anteil an Kleinstrukturen ausgewiesen worden ist.	Oblix; Spectrum; Vivendi 100; Focus Ultra (2,5 l); Fusilade Max (1,0 l); Targa Super, Gramfix (1,25 l); Targa Max (0,6 l)

Kennung	Anwendungsbestimmung	Betroffene Mittel
NT 102	wie NT 101, jedoch <b>Abdriftminderungsklasse 75 %</b>	Cliophar 600 SL, Debut DuoActive, Kezuro (NA), Lontrel 600, Lontrel 720 SG, Metafol Super, Focus Ultra (>2,5 l), Panarex (1,25 l); Targa Super, Gramfix (>1,25 l); Targa Max (>0,6 l)
NT 103	wie NT 101, jedoch <b>Abdriftminderungsklasse 90 %</b>	Decis forte, Belvedere Duo, Fusilade Max (>1,0 l), Kezuro (VA), Leopard, Panarex (>1,25 l), Trammat 500, Roundup Ultra und weitere Glyphosat-Mittel
NT 108	Bei der Anwendung des Mittels muss ein <b>Abstand von mindestens 5 m</b> zu angrenzenden Flächen (ausgenommen landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Flächen, Straßen, Wege und Plätze) eingehalten werden. Zusätzlich muss die Anwendung in einer darauf folgenden Breite von mindestens 20 m mit einem verlustmindernden Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ vom 14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung, mindestens in die <b>Abdriftminderungsklasse 75 %</b> eingetragen ist. Bei der Anwendung des Mittels ist weder der Einsatz verlustmindernder Technik noch die <b>Einhaltung eines Abstandes von mindestens 5 m erforderlich</b> , wenn die Anwendung mit tragbaren Pflanzenschutzgeräten erfolgt oder angrenzende Flächen (z. B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) weniger als 3 m breit sind. Bei der Anwendung des Mittels ist ferner die Einhaltung eines Abstandes von mindestens 5 m nicht erforderlich, wenn die Anwendung des Mittels in einem Gebiet erfolgt, das von der Biologischen Bundesanstalt im „Verzeichnis der regionalisierten Kleinstrukturanteile“ vom 7. Februar 2002 (Bundesanzeiger Nr. 70a vom 13. April 2002) in der jeweils geltenden Fassung, als Agrarlandschaft mit einem ausreichenden Anteil an Kleinstrukturen ausgewiesen worden ist oder angrenzende Flächen (z. B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) nachweislich auf landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Flächen angelegt worden sind.	Bulldock Top, Conviso One (2*0,25 l), Hunter WG, Kaiso Sorbie, Karate Zeon, Lambda WG, Lamdex Forte, Shock Down, Select 240 EC (0,75 l)
NT 109	wie NT 108, jedoch <b>Abdriftminderungsklasse 90 %</b>	Conviso One (2*0,5 l), Select 240 EC (1,0 l)

Kennung	Anwendungsbestimmung	Betroffene Mittel
NW 605	Die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführende, aber einschließlich periodisch wasserführender <b>Oberflächengewässer - muss mit einem Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ vom 14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung eingetragen ist. Dabei sind, in Abhängigkeit von den unten aufgeführten Abdriftminderungsklassen der verwendeten Geräte, die im Folgenden genannten Abstände zu Oberflächengewässern einzuhalten.</b> Für die mit «*» gekennzeichneten Abdriftminderungsklassen ist, neben dem gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebenen <u>Mindestabstand zu Oberflächengewässern, § 6 Absatz 2 Satz 2 PflSchG zu beachten.</u>	Bulldock Top, Hunter WG, Kaiso Sorbie, Lambda WG, Lamdex Forte // Amistar Gold, Ortiva, Score // Conviso One (2*0,25 l; 2*0,5 l), Debut DuoActive, Shiro, Spectrum, Venzar 500
NW 605-1	... <u>Mindestabstand zu Oberflächengewässern, das Verbot der Anwendung in oder unmittelbar an Gewässern in jedem Fall zu beachten.</u>	
NW 606	Ein Verzicht auf den Einsatz verlustmindernder Technik ist nur möglich, wenn bei der Anwendung des Mittels <b>mindestens unten genannter Abstand zu Oberflächengewässern</b> - ausgenommen nur gelegentlich wasserführende, aber einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewässer - eingehalten wird. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 50.000 Euro geahndet werden	<b>5 m:</b> Amistar Gold, Conviso One (2*0,25 l; 2*0,5 l), Debut DuoActive, Ortiva <b>10 m:</b> Score, Shiro <b>15 m:</b> Spectrum, Venzar 500 <b>20 m:</b> Bulldock Top, Hunter WG, Kaiso Sorbie, Lambda WG, Lamdex Forte
NW 607	Die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführende, aber einschließlich periodisch wasserführender <b>Oberflächengewässer - muss mit einem Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ vom 14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung eingetragen ist. Dabei sind, in Abhängigkeit von den unten aufgeführten Abdriftminderungsklassen der verwendeten Geräte, die im Folgenden genannten Abstände zu Oberflächengewässern einzuhalten.</b> Für die mit „*“ gekennzeichneten Abdriftminderungsklassen ist, neben dem gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebenen <u>Mindestabstand zu Oberflächengewässern, § 6 Absatz 2 Satz 2 PflSchG zu beachten.</u> Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 50.000 Euro geahndet werden.	Decis forte, Karate Zeon, Shock Down // Betasana SC
NW 607-1	... <u>Mindestabstand zu Oberflächengewässern, das Verbot der Anwendung in oder unmittelbar an Gewässern in jedem Fall zu beachten. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 50.000 Euro geahndet werden.</u>	



Kennung	Anwendungsbestimmung	Betroffene Mittel
NW 609	Die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführende, aber einschließlich periodisch wasserführender <b>Oberflächengewässer - muss mindestens mit unten genanntem Abstand erfolgen. Dieser Abstand muss nicht eingehalten werden, wenn die Anwendung mit einem Gerät erfolgt, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ vom 14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung eingetragen ist.</b> Unabhängig davon ist, neben dem gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebenen Mindestabstand zu Oberflächengewässern, § 6 Absatz 2 Satz 2 PflSchG zu beachten. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu 50.000 Euro geahndet werden.	5 m: Belvedere Duo, Betanal Tandem, Debut, Kaskad, Metafol Super, Tanaris , Agil S (1,5 l)
NW 609-1	Mindestabstand zu Oberflächengewässern, das Verbot der Anwendung in oder unmittelbar an Gewässern in jedem Fall zu beachten. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu 50.000 Euro geahndet werden.	
NW 701	Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von über 2 % und Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführender, aber einschließlich periodisch wasserführender - muss ein mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsener Randstreifen vorhanden sein. Dessen Schutzfunktion darf durch den Einsatz von Arbeitsgeräten nicht beeinträchtigt werden. Er muss eine <b>Mindestbreite von 10 m</b> haben. Dieser Randstreifen ist nicht erforderlich, wenn: - ausreichende Auffangsysteme für das abgeschwemmte Wasser bzw. den abgeschwemmten Boden vorhanden sind, die nicht in ein Oberflächengewässer münden, bzw. mit der Kanalisation verbunden sind oder - die Anwendung im Mulch- oder Direktsaatverfahren erfolgt.	Belvedere Duo (2*2l)
NW 705	Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von über 2 % und Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführender, aber einschließlich periodisch wasserführender - muss ein mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsener Randstreifen vorhanden sein. Dessen Schutzfunktion darf durch den Einsatz von Arbeitsgeräten nicht beeinträchtigt werden. Er muss eine <b>Mindestbreite von 5 m</b> haben. Dieser Randstreifen ist nicht erforderlich, wenn:- ausreichende Auffangsysteme für das abgeschwemmte Wasser bzw. den abgeschwemmten Boden vorhanden sind, die nicht in ein Oberflächengewässer münden, bzw. mit der Kanalisation verbunden sind oder die Anwendung im Mulch- oder Direktsaatverfahren erfolgt.	Ortiva // Belvedere Duo (3*1,3l)
NW 706	Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von über 2 % und Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführender, aber einschließlich periodisch wasserführender - muss ein mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsener Randstreifen vorhanden sein. Dessen Schutzfunktion darf durch den Einsatz von Arbeitsgeräten nicht beeinträchtigt werden. Er muss eine <b>Mindestbreite von 20 m</b> haben. Dieser Randstreifen ist nicht erforderlich, wenn:- ausreichende Auffangsysteme für das abgeschwemmte Wasser bzw. den abgeschwemmten Boden vorhanden sind, die nicht in ein Oberflächengewässer münden, bzw. mit der Kanalisation verbunden sind oder die Anwendung im Mulch- oder Direktsaatverfahren erfolgt.	Betanal Tandem, Conviso One (2*0,25 l; 2*0,5 l), Debut DuoActive, Venzar 500 SC
NW 800	keine Anwendung auf gedrainten Flächen zwischen dem 01. November und dem 15. März	Conviso One (2*0,25 l), Metafol Super, Venzar 500 SC



GEMEINSAM FÜR DIE RÜBE

# NOTIZEN

Lined writing area consisting of 18 horizontal lines on a white background.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---


---

---

---

---

AKTUELLE VERSION



jetzt herunterladen



## GESCHÄFTS- UND BERATUNGSSTELLE

Rathenaustraße 10, 67547 Worms

Telefon: 06241 921 920

Telefax: 06241 921 9299

Info-Telefon: 06241 921 92 51

E-Mail: [arge@ruebe.info](mailto:arge@ruebe.info)

Internet: [www.ruebe.info](http://www.ruebe.info)  
[www.bisz.suedzucker.de](http://www.bisz.suedzucker.de)

## BERATUNG WORMS:

SEBASTIAN ADAM

Telefon: 06241 921 92 33

Funk: 0171 976 2732

Mail: [adam@ruebe.info](mailto:adam@ruebe.info)

AXEL SIEKMANN

Telefon: 06241 921 92 44

Funk: 0170 450 1900

Mail: [siekmann@ruebe.info](mailto:siekmann@ruebe.info)



## BERATUNGSSTELLE

Gartenstraße 54, 74072 Heilbronn

Telefon: 07131 789 30

Telefax: 07131 789 319

E-Mail: [vbwz@vbwz.de](mailto:vbwz@vbwz.de)

## BERATUNG HEILBRONN:

MAXIMILIAN GROSS

Funk: 0170 4119642

E-Mail: [gross@vbwz.de](mailto:gross@vbwz.de)